



Figs. 1-10. Varios aspectos de obreras de *Mycetoseritis* y *Mycocephurus*, todos hechos a la misma escala: 1) cabeza del holotipo de *M. vinsoni*; 2) mesosoma y peciolo de *M. vinsoni*; 3) escapo de *M. hartmanni*; 4) mesosoma de *M. hartmanni*; 5) cabeza de *M. curvispinosus*; 6) mesosoma de *M. curvispinosus*; 7) espina propodeal de *M. smithi*; 8) promesonoto de *M. smithi*; 9) promesonoto de *M. curvispinosus*; 10) promesonoto de *M. goeldii*.

artejos, el último 0.29 mm de largo, tan largo como los cinco artejos próximos; carinas frontales bien formadas, extendidas hasta las esquinas de la cabeza, los lóbulos grandes; la carina preocular corta, la cual se extiende un poco mas atrás del borde posterior del ojo, no se dobla hacia las carinas frontales (Fig. 1), y no forma escrobo con la carina frontal; pronoto con espina humeral bien formada, (Fig. 2); mesonoto sin espinas, pero con dos pares de abulta-

mientos; propodeo con dos espinas pequeñas; peciolo sin espinas.

Pilosidad consiste de pelos curvos y aplanados al cuerpo; algunos en el dorso de la cabeza, en las carinas frontales y alrededor de las mandíbulas son rectos; pubescencia ausente.

Escultura opaca, mandíbulas poco brillantes, con estrias. Color rojo oscuro.