

Variables	AI			AC		
	OMA \bar{X}	OME \bar{X}	CV	OMA \bar{X}	OME \bar{X}	CV
LES	2,9	2,6	5	2,9	2,1	16,1
ACE	3,4	2,5	8,4	3,2	1,9	22,1
LCE	2,5	1,9	8,9	2,4	1,5	20,7
LMA	2,2	1,6	10,1	2,3	1,1	35,8
AMA	0,93	0,69	21,7	0,77	0,45	37,8
DLO	4,7	2,9	9,6	4,1	2,1	23,8
D1	2,1	1,6	11,2	2,0	1,4	22,1
D2	1,5	1,1	19,1	1,6	0,84	41,7
D3	1,7	1,2	17,5	1,7	0,94	19,1
LPE	0,60	0,47	19,1	0,53	0,35	37,1
LPP	1,0	0,70	14,3	1,1	0,56	28,6
APE	0,93	0,43	18,6	0,77	0,25	32,0
APP	1,4	0,73	20,8	1,4	0,50	26,0
LFE	6,1	4,8	7,1	5,4	3,7	19,7
IES	86,1	104,6	8,9	92,6	115,9	10,7
ICE	34,6	141,0	9,8	134,5	123,7	10,6
IMC	65,7	63,6	10,5	71,7	59,9	19,5
IMA	43,5	53,8	37,2	33,5	40,2	20,4
ILO	73,4	83,5	5,3	77,8	90,8	8,0
ID1	60,9	62,5	12,3	59,0	77,2	12,6
ID2	43,6	42,5	16,2	49,0	45,3	29,3
ID3	39,4	48,4	14,7	53,2	52,5	13,5

Tabla 1. Valores medios (X) y coeficiente de variación (CV) de las obreras mayores (OMA) y medianas (OME) de *A. insularis* (AI) y *A. cubana* (AC). No se consigna CV de OMA por el caso tamaño de muestra.

Table 1. Mean values (X) and variation coefficient (CV) of major workers (OMA) and middle workers (OME) of *A. insularis* (AI) and *A. cubana* (AC). It is not offered CV of OMA because the small sample size.

Descripción del holotipo. (obrero mediana). Antenas con 11 segmentos; maza antenal triarticulada; escapo muy alargado. Cabeza cordiforme, con los ojos bien desarrollados y situados lateralmente. Las mandíbulas son largas y robustas, con los bordes dentados y el diente apical prominente y grueso. Clipeo ensanchado en la región central y muy estrecho hacia los laterales. Lóbulos y carinas frontales prominentes. Los lóbulos occipitales son anchos y sobresalientes, separados por un surco profundo, con una espina pequeña y aguda en su cara anterior y otra mayor en la cara posterior. Gena con una espina pequeña, dirigida hacia atrás. El alitrongo es robusto y sinuoso, con la región pronotal más elevada que la propodeal; espiráculos conspicuos. El ángulo humeral posee una espina corta y aguda, dirigida hacia adelante. La región dorsal del alitrongo porta tres pares de espinas separadas en la base, divergentes y agudas; el primer par es el más grueso y se encuentra orientado hacia arriba y adelante; el segundo par es el más pequeño y se encuentra dirigido hacia arriba y hacia los lados; el tercer par de espinas es de forma curvada y está dirigido hacia atrás. El peciolo y el postpeciolo son más anchos en su zona poste-