

especies, sino longitudinal (Fig. 1), lo que la asemeja a *M. wheeleri* (ver Baroni-Urbani, 1978) en este sentido. No obstante, se diferencia claramente de esta especie por el patrón de estriación de la cabeza, que resulta muy distintivo; y sobre todo por la estriación longitudinal del alitrongo, la cual se torna reticulada en la región latero-dorsal del alitrongo de *M. wheeleri*. Además, difieren tanto en aspectos de coloración como morfométricos.

Macromischa affinis Mann

M. affinis Mann 1920, *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 42:417.

Comentarios. Esta especie fue colectada por Mann (1920) en Piedra Gorda; Baroni-Urbani (1978) examinó ejemplares de Imías, Pico Turquino y La Gran Piedra. Todas estas localidades se encuentran al S de las provincias orientales. L. F. de Armas colectó dos ejemplares en la Loma de la Mensura, Pinares de Mayarí, cercana a la costa N de Holguín, en junio de 1990. Dicho colector la observó sobre árboles, en una pluvisilva a 640 m snm. Baroni-Urbani (1978) la catalogó como especie arborícola.

Macromischa creightoni Mann 1929

M. creightoni Mann 1929, *Proc. Entomol. Soc. Washington*, 31:163.

Nuevas localidades. Descrita de Nueva Gerona, Isla de Pinos (Isla de la Juventud). Hasta el momento se consideraba endémica de dicha isla. En un lote de hormigas colectadas por A. Pérez Asso en las alturas de Somorrostro, al SE de La Habana; el 28 de agosto de 1986, el autor detectó un ejemplar de la especie.

Historia natural. Hábitat petrícola, como se ha señalado igualmente para la población de la Isla de la Juventud (Alayo, 1986).

Comentarios. La escasez de material disponible de ambas poblaciones no permite realizar comparaciones objetivas, aunque el ejemplar de La Habana exhibe coloración y reflejos más apagados que los observados en el de la Isla de la Juventud.

Macromischa melanocephalum Wheeler 1931

M. melanocephalum Wheeler 1931, *Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard*, 12:15.

Nuevas localidades. Esta especie se conocía de la localidad tipo, cerca de Bahía de Cochinos, Ciénaga de Zapata. J. C. Trujillo colectó un ejemplar bajo piedra, en la reserva de Guajaibón, al W de La Habana, en 1986.

Comentarios. Su pequeño tamaño y hábitos terrícolas la hacen una especie difícil de coleccionar, por lo que probablemente su distribución sea más amplia que la actualmente conocida. Por ejemplo, *M. torrei*, que se consideraba endémica de las provincias centrales y orientales, se encontró recientemente en la Florida (Deyrup *et al.*, 1989).

Macromischa myersi Wheeler 1931

M. myersi Wheeler 1931, *Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard*, 72:20.