

Nuevas localidades. Sólo se conocía de las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus, en Cuba Central. A. Pérez-Asso la colectó en Somorrostro, junto a *M. creightoni*, lo que amplía la distribución de la especie hasta el occidente de Cuba.

Macromischa scabripes Mann 1920

M. scabripes Mann 1920, *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 42:416.

Comentarios. La descripción de esta especie se basó en dos obreras colectadas en Cayo Sactía, al N de la provincia de Holguín, en la región oriental de Cuba. Baroni-Urbani (1978) examinó dos obreras de Arroyo la Costa, al S de la provincia de Guantánamo, y expuso sus dudas acerca de la validez taxonómica de esta especie, al considerarla muy semejante morfológicamente a *M. splendens*, de Bahamas. No obstante, reconoció las diferencias notables que existen en la coloración de ambos táxones, como había enfatizado Mann (1920). L. F. de Armas colectó una serie de siete ejemplares en Cayo Sabinal, Pinares de Mayarí y Cumbre de la Mensura, Mayarí, Holguín, en junio de 1990. Estas localidades se encuentran muy cercanas a la tipo. En el examen de todos estos ejemplares se observan las características diferenciales consignadas por Mann (1920) y admitidas por Baroni-Urbani (1978), lo que permite reconocer la validez de su estado específico.

Historia natural. Mann (1920) comentó que había colectado la especie en hábitat arborícola, aunque Alayo (1986) la clasificó, sin más detalles, como petrícola. L. F. de Armas observó que la especie era relativamente común sobre árboles y arbustos en pinares y vegetación xeromórfica, entre los 640 y 995 m snm.

RECONOCIMIENTOS

A los especialistas Alberto R. Estrada y Giraldo Alayón por haberme facilitado el material de *Macromischa* que resultó una nueva especie, y a Luis F. de Armas por la ayuda brindada y la entrega de material colectado por él y por Antonio Pérez-Asso.

REFERENCIAS

- Alayo, P. (1986): Observaciones en himenopteros cubanos. II. Subgénero *Macromischa* Formicidae: Leptothorax). *Rep. Inv.*, 22:1-27.
- Baroni-Urbani, C. (1978): Materiali por una revision dai *Leptothorax* neotropical appartenenti al sottogenere *Macromischa* Roger, n. comb. (Hymenoptera: Formicidae). *Entomol. Brasil*, 3:395-618.
- Deyrup, M., C. Johnson, G. C. Wheeler, y J. Wheeler (1989): A preliminary list of the ants of Florida. *Florida Entomol.*, 72:91-101.
- Hölldober, B., y E. O. Wilson (1990): *The ants*.
- Mann, W. M. (1920): Additions to the ant fauna of the West Indies and Central America. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 42:403-439.
- (1929): Notes on Cuban ants of the genus *Macromischa*. *Proc. Ent. Soc. Washington*, 31:161-166.