

УДК 595.796

© 1996 г. А.Г. РАДЧЕНКО

**ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МУРАВЬЕВ РОДА
CAMPONOTUS (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) АЗИАТСКОЙ
ЧАСТИ ПАЛЕАРКТИКИ**

В статье приведена определительная таблица муравьев рода *Camponotus* Mayr палеарктической части Азии, включающая 53 вида.

Мировая фауна *Camponotus* Mayr насчитывает около 1000 видов, в том числе почти 100 видов в Палеарктике. Ревизия этого рода в пределах Палеарктики (как и большинства других регионов Земли) до сих пор не проведена. В той или иной степени разрешены вопросы определения видов *Camponotus* Западной Европы (без Пиренейского п-ова) (Agosti, Collingwood, 1987, 1987a), Европейской части бывшего СССР (Арнольди, Длусский, 1978), Армении (Аракелян, 1994), Туркменистана (Длусский и др., 1990), Дальнего Востока бывшего СССР (Купянская, 1981, 1990), Саудовской Аравии (Collingwood, 1985), Китая (Wang, Xiao, Wu, 1989, 1989a) и Японии (Morisita et al., 1991); к сожалению, определительная таблица по *Camponotus* Киргизии (Тарбинский, 1976) составлена со значительными ошибками.

В ряде крупных регионов, имеющих самобытную и богатую фауну *Camponotus*, определять представителей этого рода невозможно в связи с отсутствием определительных таблиц (Пиренейской п-ов, Северная Африка, Ближний Восток, Малая, Передняя, Центральная и частично Средняя Азия). Старые работы, включающие определительные таблицы *Camponotus* (Рузский, 1905; Emery, 1908 и др.), устарели и пользоваться ими практически невозможно.

Приведенная ниже определительная таблица *Camponotus* включает 53 вида из азиатской части Палеарктики. В нее не включен ряд видов из Аравии, Китая и Японии. Подробный обзор видов и замечания по синонимии будут даны в последующих работах.

**ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА CAMPONOTUS MAYR АЗИАТСКОЙ
ЧАСТИ ПАЛЕАРКТИКИ (РАБОЧИЕ)**

- 1(2) Голова у солдат и самок спереди косо обрезана (рис. 1,а), клипеус и лоб образуют плоскую круглую площадку с грубой гранулированной скульптурой. У рабочих голова округлой формы, проподеум сдавлен с боков и его основная поверхность в профиль с поперечным вдавлением (рис. 1,б). Голова и грудь красные, брюшко черно-бурое. – Южная и Средняя Европа, северо-запад Африки, Крым, Кавказ, Копетдаг, Ближний Восток
..... *C. truncatus* (Spinola)
- 2(1) Голова у самок и солдат обычной формы, не обрезана спереди, проподеум рабочих иной формы.