



Рис. 1. Детали строения представителей рода *Comptonotus*: а, б – *Comptonotus truncatus*; в, з – *C. sericeus opaciventris*; д – *C. libanicus* (по Emery, 1915); е – *C. aegae* (по Emery, 1915); ж – *C. kiesenwetteri*; з, и – *C. lateralis*; к – *C. staryi*, паратип; л – *C. kurdistanicus* (по Emery, 1925); м – *C. rebeccaе* (по Emery, 1925); н – *C. interjectus*; о – *C. semirufus*, паратип; п – *C. piceus*; р – *C. gestroi*; с – *C. lateralis* (а – голова в профиль, солдат; б, ж, з, к, н-р – грудь и стелек в профиль; з, и – прилегающее опушение тергитов брюшка; д, е, л, м – спинной профиль груди и стелек; с – клипеус, рабочие)

3(32) Горизонтальная и покатая поверхность проподоума образуют острый или прямой (очень редко – тупой) угол; мезопрододеальное вдавление чаще явственное, иногда слабое или отсутствует (рис. 1, в, ж, з, к, н-р); проподоум сверху уплощен, с горизонтальной или выпуклой площадкой. Нижний край клипеуса с явственной вырезкой посередине (кроме *C. sericeus opaciventris*, см. тезу 4).

4(5) Брюшко с густым шелковистым прилежащим опушением, расстояние между волосками в несколько раз меньше их длины (рис. 1, з); петиолус с