

- очень толстой, узловидной чешуйкой (рис. 1, в). – Индия, Афганистан ..... *C. sericeus opaciventris* Maug
- 5(4) Брюшко с редким прилежащим опушением, расстояние между волосками равно их длине или больше (рис. 1, и); чешуйка петиолюса намного более тонкая, не узловидная (рис. 1, ж, з, к, н-р).
- 6(13) Тело густо скульптурированное, полностью матовое.
- 7(10) Грудь без мезопроподеального вдавления (рис. 1, д, е).
- 8(9) Чешуйка толстая, широко закругленная на вершине (рис. 1, д). – Малая Азия, Ближний Восток ..... *C. libanicus* E. André (= *C. libanicus* r. *sahlbergi* Forel, syn. n.)
- 9(8) Чешуйка более тонкая, приостренная к вершине (рис. 1, е). – о-в Родос, Малая Азия ..... *C. aegaea* Emery, stat. n.
- 10(7) Грудь хотя бы со слабым мезопроподеальным вдавлением (рис. 1, ж).
- 11(12) Проподеум сзади с зубцеобразными выростами (рис. 1, ж) – Греция, острова Эгейского моря, Малая Азия ..... *C. keisenwetteri* Röger
- 12(11) Проподеум сзади без зубцеобразных выростов. – Малая Азия ..... *C. boghossiani* Forel
- 13(6) Тело слабо скульптурированное, блестящее, особенно брюшко.
- 14(29) Тело двуцветное: голова или грудь, либо и голова, и грудь хотя бы частично красные, брюшко черное.
- 15(26) Отстоящие волоски на верху проподеума имеются лишь на его заднем крае (рис. 1, з, к).
- 16(21) Мезопроподеальное вдавление глубокое (рис. 1, з, к).
- 17(18) Голова, мезонотум, проподеум, петиолюс и брюшко черные или темно-бурые, пронотум, ноги и антенны красные или буровато-красные, – Копетдаг ..... *C. kopetdaghensis* Dlussky et Zabelin
- 18(17) Голова и грудь красные, брюшко черное или темно-бурое.
- 19(20) Брюшко одноцветное, от темно-бурого до черного; проподеум слабо приподнятый, сверху выпуклый (рис. 1, з). – Южная Европа, северо-запад Африки, Крым, Кавказ, Малая Азия, Ближний Восток, Копетдаг ..... *C. lateralis* (Olivier)
- 20(19) I тергит брюшка буровато-красный, остальная часть брюшка черно-бурая; проподеум сильно приподнятый, сверху слегка уплощенный (рис. 1, к) – Ирак ..... *C. staryi* Pisarski
- 21(16) Мезопроподеальное вдавление слабое или отсутствует (рис. 1, л, м).
- 22(25) Мезопроподеальное вдавление отсутствует (рис. 1, л).
- 23(24) Грудь красная, голова и брюшко черно-бурые. – Малая Азия, Ирак; Азербайджан (?) ..... *C. kurdistanicus* Emery
- 24(23) Голова и грудь красные (у мелких рабочих лоб и темя буровато-красные), брюшко черно-бурое. – Югославия, Балканы, Малая Азия ..... *C. vogti* Forel
- 25(22) Грудь со слабым мезопроподеальным вдавлением (рис. 1, м). Голова и грудь красные, брюшко черно-бурое. – Сирия ..... *C. rebecca* Forel, stat. n.
- 26(15) Отстоящие волоски на верху проподеума имеются на всей его поверхности (рис. 1, н-р).
- 27(28) Голова и брюшко черные, грудь красная, иногда с бурыми пятнами. Мезопроподеальное вдавление более глубокое (рис. 1, н). – Средняя Азия, Афганистан; Дагестан (?); Ближний Восток (?) ..... *C. interjectus* Maug
- 28(27) Голова у крупных рабочих красная, у мелких – красно-бурая, грудь красная, брюшко черное. Мезопроподеальное вдавление более слабое (рис. 1, о). – Средняя Азия, Южный Казахстан ..... *C. semirufus* Kuznetsov-Ugamskij