



Рис. 3. Детали строения представителей рода *Camponatus*: а - *C. xerxes*; б, в - *C. yessensis*; г, д - *C. vagus*; е - *C. herculeanus*; ж - *C. atrox*; з - *C. reihardtii*; и - *C. japonicus*; к - *C. saxatilis* (а, в, д - грудь и стебелек в профиль; б, г - голова спереди; е, ж - прилежащее опушение тергитов брюшка; з - клипеус; и, к - мандибулы)

- 31(30) Грудь со слабым мезопроподеальным вдавлением или без него, горизонтальная поверхность проподеума образует с покатою прямой или немного тупой закругленный угол; чешуйка у крупных рабочих тоньше, ее передняя поверхность слабо выпуклая (рис. 1, р). - Южная Европа, северо-запад Африки, Малая Азия, Ирак, Ближний Восток, южное Закавказье ..... *C. gestroi* Emery
- 32(3) Грудь в профиль равномерно выпуклая, ее верхний край образует более или менее правильную дугу, мезопроподеальное вдавление отсутствует (рис. 2, л; 3, а, в, д). Проподеум уплощен с боков, сверху без горизонтальной площадки. Нижний край клипеуса с вырезкой или без нее.
- 33(40) Нижний край клипеуса с явственной вырезкой посередине (рис. 1, с).
- 34(35) Тело черное (переднегрудь может быть красноватая), на I и II тергитах брюшка по два желтовато-белых пятна. - Юг Дальнего Востока, Япония, Северо-восточный Китай, Корея ..... *C. quadrinotatus* Forel