

- 35(34) Тело черное, либо голова и грудь, либо только грудь красные, брюшко без светлых пятен.
- 36(37) Голова и грудь красные, брюшко черное. – Средняя Азия, Южный Казахстан ..... *C. lameeri* Emery
- 37(36) Голова и брюшко черные, грудь черная или красная.
- 38(39) Голова и брюшко черные, грудь черная или красная (встречаются переходные по окраске груди особи), ноги одноцветные, бурые или красновато-бурые – Европа, северо-запад Африки, Малая Азия, Кавказ .....  
..... *C. fallax* Nylander
- 39(38) Тело полностью черное, жгутик антенн, голени и лапки буроватые, бедра и тазики ярко желто-красные. – Гималаи ..... *C. himalayanus* Forel, stat. n.
- 40(33) Нижний край клипеуса без вырезки посередине (рис. 2, а, в, и, к; 3, б, г).
- 41(84) Нижний край клипеуса с явственной прямоугольной или трапециевидной лопастью, выступающей вперед за линию, соединяющую передние углы головы (рис. 2, а, в, и, к).
- 42(43) Брюшко с густым, коротким, шелковистым прилежащим опушением, длина волосков в несколько раз больше расстояния между ними (рис. 2, е). – Южное Закавказье, Турция, Иран ..... *C. armeniacus* Arnoldi, stat. n.
- 43(42) Брюшко с редким, коротким прилежащим опушением, длина волосков меньше расстояния между ними (рис. 2, ж).
- 44(45) Голени без шипиков на внутреннем крае и без отстоящих волосков. Нижняя поверхность, бока и затылочный край головы с короткими отстоящими волосками. Тело черно-бурое, лишь основание I тергита брюшка желтое. – Ирак ..... *C. shaqualavensis* Pisarski, stat. n.
- 45(44) Голени либо с шипиками на внутреннем крае, либо с отстоящими волосками (рис. 2, б, д, м, н).
- 46(55) Голени и скапус с отстоящими или хотя бы полуотстоящими волосками, голени без шипиков на внутреннем крае (рис. 2, б).
- 47(54) Многочисленные отстоящие волоски имеются на всей поверхности головы, так что щеки, виски и затылочные углы с волосками (рис. 2, а).
- 48(49) Тело одноцветное бурое. – Ирак ..... *C. riedeli* Pisarski, stat. n.
- 49(48) Тело иного цвета, если темно-бурое, то основание брюшка всегда светлее его вершины.
- 50(51) Голова и грудь у крупных рабочих от охристо-желтого до темно-бурого, основание брюшка от желтого до желто-бурого, вершина брюшка обычно темнее основания. Мелкие рабочие желтые или желто-бурые, с более темной головой. – Тибет, Памир, Средняя Азия, Южный Казахстан, Афганистан, Иран, Закавказье .....  
..... *C. buddhae* Forel (= *C. obliquipilosus* Forel, syn. n.)
- 51(50) Голова черная, грудь хотя бы частью красная.
- 52(53) Голова и брюшко черные, грудь полностью красная. – Малая Азия, Ближний Восток ..... *C. festai* Emery
- 53(52) Голова и вершина брюшка черные, грудь черная с красными пятнами на боках, задняя часть проподоума и основание брюшка красные. – Югославия, Болгария, Греция, острова Эгейского моря, Малая Азия .....  
..... *C. samius* Forel
- 54(47) Отстоящие волоски на голове более редкие, имеются на щеках, виски и затылочные углы без волосков (рис. 2, в). Тело желтое, различных оттенков. – Средняя Азия, Казахстан, Афганистан, Иран, Закавказье, Сирия ..... *C. fedtschenkoi* Maug
- 55(46) Голени и скапус без отстоящих волосков, голени с шипиками на внутреннем крае (рис. 2, д, м, н).