

- 56(69) Голова снизу с отстоящими волосками, хотя бы короткими и немногочисленными (рис. 2, з, э).
- 57(62) Щеки без отстоящих волосков.
- 58(59) Голова снизу с многочисленными длинными, часто изогнутыми отстоящими волосками (рис. 2, з). Голова и грудь красные, брюшко черное. – Средняя Азия, Южный Казахстан, Афганистан, Иран, Закавказье *C. turkestanicus* Emery (= *C. attila* Staercke, syn. n.)
- 59(58) Голова снизу с немногочисленными короткими отстоящими волосками (рис. 2, э). Тело иного цвета.
- 60(61) Грудь и передняя половина брюшка желтые или буровато-желтые, голова желто-бурая, задняя половина брюшка черно-бурая. – Острова Эгейского моря, Малая Азия, Аравия *C. baldacci* Emery
- 61(60) Тело черное. – Египет, Ближний Восток, Сирия, Ирак, Аравия *C. fellah* Tohme
- 62(57) Щеки по крайней мере у крупных рабочих с отстоящими волосками.
- 63(64) Тело от бурого до черного. – Южная и Средняя Европа, северо-запад Африки, юг Восточной Европы, Кавказ, Ближний Восток, Копетдаг, Таджикистан, Афганистан *C. aethiops* (Latreille)
- 64(63) Тело от красного до буровато-красного или желтое разных оттенков.
- 65(66) Грудь оранжево-красная, голова и брюшко буровато-красные. – Южное Закавказье, Иран *C. karawajewi* Radtschenko, nom. n. pro *C. maculatus aethiops* var. *clara* Karawajew
- 66(65) Тело желтое или оранжево-желтое
- 67(68) Тело светло-желтое, отстоящие волоски на голове более редкие, виски и затылочные углы без отстоящих волосков (рис. 2, и). – Киргизия *C. tashkumiri* Tarbinsky
- 68(67) Тело оранжево-желтое, отстоящие волоски на голове более многочисленные, виски и затылочные углы с отстоящими волосками (рис. 2, л). – Ирак *C. arnoldi* Pisarski
- 69(56) Голова снизу без отстоящих волосков.
- 70(71) Тело полностью желтое, даже у крупных рабочих. – Средняя Азия, Казахстан, Афганистан, Иран, Талыш *C. turkestanus* André
- 71(70) Тело иного цвета.
- 72(75) Тело одноцветное, черное или черно-бурое.
- 73(74) Грудь короткая, кореная, чешуйка сужена к вершине, приостренная (рис. 2, л). – Южная и Юго-Восточная Азия, Афганистан; Тибет (?) *C. compressus* (Fabricius)
- 74(73) Грудь более длинная, стройная, чешуйка узко закруглена на вершине (рис. 3, а). – Туркменистан, Афганистан, Иран, Ирак, Аравия, Закавказье .. *C. xerxes* Forel (= *C. compressus irakensis* Menozzi, syn. n.)
- 75(72) Тело иного цвета.
- 76(77) Щеки с несколькими отстоящими волосками. Грудь желтая (у крупных рабочих частью буровато-желтая), голова желто-бурая. – Гималаи *C. kattensis* Bingham, stat. n.
- 77(76) Щеки без отстоящих волосков.
- 78(79) Голова и грудь красные или буровато-красные, брюшко одноцветное, темно-бурое. – Ирак *C. evansi* Crawley
- 79(78) Голова от красно-бурого до черного, грудь от желто-бурого до красно-бурого, основание брюшка всегда светлее его вершины.
- 80(81) Голени слабо уплощены с боков, их внешняя поверхность выпуклая, не