

- ограничена по бокам резкими продольными кантиками (рис. 2, м). – Туркменистан, Афганистан, Иран *C. bactrianus* Pisarski
- 81((80) Голени уплощены с боков, их внешняя поверхность плоская, ограничена по бокам резкими продольными кантиками (рис. 2, н).
- 82(83) У крупных рабочих голова от красно-бурого до черного, грудь желто-бурая, сверху часто затемнена, брюшко темно-бурое с охристо-желтым I тергитом. У мелких рабочих грудь и I тергит брюшка желтые или охристо-желтые, голова и остальная часть брюшка буровато-красные. – Северная Африка, Ближний Восток, Аравия; Афганистан (?) *C. oasisium* Forel
- 83(82) У крупных рабочих голова черная, грудь красно-бурая, сверху часто затемнена, брюшко черно-бурое с красно-бурым I тергитом. У мелких рабочих грудь и I тергит брюшка от оранжево-красного до красно-бурого, голова и остальная часть брюшка темно-бурые. – Балканы, Ближний Восток, Ирак, Афганистан *C. sanctus* Forel (= *C. thoracicus ninivae* Pisarski, syn. n.)
- 84(41) Нижний край клипеуса без явственной прямоугольной или трапециевидной лопасти, не выступает или едва выступает за линию, соединяющую передние углы головы (рис. 3, б, з).
- 85(88) Затылочный край головы с отстоящими волосками.
- 86(87) Все тело, в том числе бока головы и скапус, с многочисленными отстоящими волосками (рис. 3, б, в). – Приморье, Япония *C. yessensis* Teranishi
- 87(86) Отстоящие волоски на теле более редкие, бока головы и скапус без отстоящих волосков (рис. 3, г, д). – Европа, северо-запад Африки, Кавказ, на восток – до Алтая (восточнее Урала очень редок) *C. vagus* (Scopoli)
- 88(85) Затылочный край головы без отстоящих волосков.
- 89(98) Грудь красная различных оттенков.
- 90(93) Передняя половина I тергита брюшка красная, остальная часть брюшка черно-бурая.
- 91(92) Бедр красные, такого же цвета, как и грудь, или немного темнее. – Европа, Кавказ *C. ligniperdus* (Latreille)
- 92(91) Бедр бурые, явственно темнее груди. – Охотск, Сахалин, Курилы, Япония, Корея *C. obscuripes* Mayr
- 93(90) Брюшко полностью черное, иногда может быть красноватое пятно на покато́й передней по поверхности I тергита.
- 94(95) Прилежащее опушение на брюшке короткое, длина волосков равна расстоянию между ними или меньше (рис. 3, е). – Лесная зона и горы Европы, Кавказ, Малая Азия, Урал, Западная Сибирь, Северный Казахстан, Киргизия *C. herculeanus* s. str. (Linnaeus)
- 95(94) Прилежащее опушение на брюшке более длинное, длина волосков в 1,5–2 раза больше расстояния между ними (рис. 3, ж, з).
- 96(97) На наличнике по бокам от срединной линии имеются крупные щетинконосные ямки (рис. 3, з). – Киргизия *C. reihardi* Arnoldi
- 97(96) Наличник без крупных щетинконосных ямок. – Корея *C. atrox* Emery
- 98(89) Тело полностью черное, низ головы и мандибулы могут быть красноватые¹.
- 99(100) Скульптура мандибул сглаженная, с редкими ямками и без морщинок в базальной части (рис. 3, и). – Восточный Казахстан, Забайкалье, Монголия, Северный Китай, Корея, Дальний Восток, Курилы, Япония *C. japonicus* Mayr

¹ Из Турции был описан *C. cilicicus* Emery, 1908, сходный с *C. vagus* и характеризующийся черным телом, коротким желтоватым прилежащим опушением на брюшке и желтыми отстоящими волосками на теле. Я не видел подобных экземпляров и затрудняюсь высказывать суждение о систематическом положении этой формы.