

Habitat in Europa, pernoctat in Geranii phaci rostris,
mordicus apprehensis.

Variat scutello albo et ferrugineo.

- ruficornis*. 4. N. antennis, pedibus punctisque quatuor scutelli ferrugineis, abdomine luteo variegato. *Syst. Ent.* 389. 3.
Apis ruficornis antennis pedibus duobus punctisque thoracis ferrugineis, abdomine luteo variegato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 958. 34. *Fn. Sv.* 1707.

Habitat in Europae floribus.

Thorax ferrugineo lineatus.

- Fabriciana*. 5. N. nigra, abdomine glabro ferrugineo, maculis duabus flavis. *Syst. Ent.* 389. 4.

Apis Fabriciana. *Linn. Syst. Nat.* 2. 955. 17.

Habitat Vpsaliae.

- gibba*. 6. N. nigra, abdomine rufo apice nigro. *Syst. Ent.* 389. 5.

Nomada succincta. *Scop. Ann. Hist. nat.* 4. 45. 2.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

- Hattorfiana*. 7. N. nigra, abdominis secundo segmento ferrugineo, maculis tribus nigris. *Syst. Ent.* 389. 6. *

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

- cingulata*. 8. N. cinereo villosa, abdomine glabro nigro, segmento secundo tertioque ferrugineis. *Syst. Ent.* 390. 7. *

Habitat in Sueciae nemoribus.

124. FORMICA.

- herculeana*. 1. F. nigra, abdomine ovato, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 391. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 962. 1. *Fn. Sv.* 1720.
Formica magna, hippomyrmex. *Linn. It. Gotl.* 232.
Formica maxima. *Raj. Inf.* 69.

Scop. carn. 832.

Habitat in Europae, Americae truncis putrescentibus vagabunda.

- smaragdina*. 2. F. viridis, thorace flavo sublineato. *Syst. Ent.* 828. *

Habitat in India. *Dom. Edler.*

- rufipes*. 3. F. hirta atra, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 391. 2. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*