

Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma, auctorum loca natalia, metamorphosis adiectis observationibus descriptionibus. Tome I. Nambu, & Kiel: C.E. Bohm, SS2 pp-

**CLASS. III. SYNISTATA. Formica. 489**

4. *F. atra*, capite rufo, squama petiolari didyma. *Syst. erythrocephala.*  
*Ent.* 391. 3. \*  
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
5. *F. nigra*, abdomine cinerascente, squama petiolari didyma. *didyma.*  
Habitat in Italia. *D. Allioni.*  
Statura *F. rufae*. Caput nigrum antennis piceis. Thorax gibbus, niger, immaculatus. Abdomen ouatum, pube cinerea nitidum. Squama petiolaris ouata, didyma vel potius late emarginata. Pedes nigri tibiis piceis.
6. *F. nigra*, thorace compresso pedibusque ferrugineis. *rufa.*  
*Syst. Ent.* 391. 4.  
*Formica rufa* thorace compresso toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 962. 3.  
*Fn. Sv.* 1721.  
*Formica ferruginea* capite abdomineque brunneis squamae petiolari. *Degeer Inf.* 2. 2. 305. 1. tab. 41. fig. 1. 2.  
*Formica fusca* thorace fuluo. *Geoff. Inf.* 2. 428.  
*Formica media rubra.* *Raj. Inf.* 69.  
Habitat in Europae, Americae aceruis acerosis, syluaticis, pungens aculeo obsoleto.  
Formicarum respublica consistit maribus feminisque alatis, incuriis, gulae deditis, spadonibusque numerosis, apteris, indefessis. Hae corradunt quisquillas in aceruum, sustentant mares feminasque sub nuptiis, at peractis puerperiis parentes expellunt, retentis liberis pro conseruatione familiae.
7. *F. atra*, abdomine pubescente. *Syst. Ent.* 392. 5. \* *pubescens.*  
Habitat in Hungaria. *Mus. Tottianum.*
8. *F. nigra nitida*, ano piceo. *Syst. Ent.* 392. 6. *nigra.*  
*Formica nigra* tota nigra nitida, tibiis cinerascens.  
*Linn. Syst. Nat.* 2. 963. 5. *Fn. Sv.* 1723.  
*Formica nigra* squama petiolari, plantis antennisque dimidiato ferrugineis. *Degeer Inf.* 2. 2. 323. 4. tab. 42. fig. 16.  
*Formica atra.* *Geoff. Inf.* 2. 429.