

15. *F. nigra*, thorace postice femoribusque ferrugineis, abdomine pallido maculato. *maculata*.  
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks*.  
 Media. Caput magnum, atrum maxillis breuibus, multidentatis. Antennae apice piceae. Thorax compressus, antice niger, postice ferrugineus. Abdomen ouatum, pilosum, nigrum lateribus pallido maculatis. Pedes nigri femoribus ferrugineis.
16. *F. atra*, capite, antennis plantisque ferrugineis, petiolo binodi. *Syst. Ent.* 393. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 962. 2. *barbara*.  
 Habitat in Africa.
17. *F. nigra*, thorace rufo postice bidentato, petiolo binodi. *Syst. Ent.* 393. 12. \* *aegyptiaca*.  
 Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl*.
18. *F. nigra*, capite maxime rufo, petiolo binodi. *Syst. Ent.* 393. 13. \* *binodis*.  
 Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl*.
19. *F. thorace punctis eleuatis*, petiolo binodi, corpore testaceo, abdomine minuto. *Linn. Syst. Nat.* 2. 964. 12. *omniuora*.  
*Formica pusilla* rufa, abdomine fulco, pedibus testaceis, thorace bidentato. *Degeer Inf.* 3. 611. 9. tab. 31. fig. 23. 24.  
 Habitat Surinami.
20. *F. flaua*, abdomine ouato pubescente. *flaua*.  
*Formica flaua* squama petiolari. *Degeer Inf.* 2. 2. 326. 5. tab. 42. fig. 24—28.  
 Habitat in Europae borealis syluis.  
 Parua, magnitudine tamen differt.
21. *F. nigra*, abdominis petiolo binodi, scutello bidentato. *Syst. Ent.* 393. 14. *caespitum*.  
*Formica caespitum* abdominis petiolo binodis, priori subtus thoraceque supra bidentato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 963. 11. *Fn. Sv.* 1726.  
*Formica ferruginea*, capite abdomineque aculeatis rufis, thorace bispinoso. *Degeer Inf.* 2. 2. 334. 7. tab. 43. fig. 21. 22.