

Formica binodis. Linn. *Amoen. acad.* 6. 413. 94.

Sulz. Hist. Inf. tab. 17. fig. 20. 21. 22.

Alt. Havniens. 10. 1. tab. 1. fig. 1. 2. 3.

Scopol. carn. 837.

Hamb. Mag. 5. 393.

Habitat in Europae pratis ficcioribus sub muscis. Mares feminaeque examinant medio Augusti, meridie calido, more Phryganearum in aere choreas agentes turma volatili, depluentes per paria iuncta. Linn.

tuberum. 22. *F. rufa*, capite abdominisque fascia nigris, petiolo binodi. *Syst. Ent.* 393. 15. *

Habitat in Suecia.

australis. 23. *F. nigra*, thorace inermi, squama petiolari bispinosa. *Syst. Ent.* 393. 16. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

bidens. 24. *F. thoracis gibbere bidentato*, capite ouato, antennis ferrugineis, articulo infimo nigro. Linn. *Syst. Nat.* 2. 964. 13.

Formica rufo fusca, antennis ferrugineis, articulo infimo nigro, capite ouato, thoracis gibbere bidentato, petiolo squama erecta. *Degeer Inf.* 3. 600. 1. tab. 31. fig. 1. 2.

Habitat Surinami.

bifscutata. 25. *F. thorace bidentato*, squama petiolari duplicata. *Syst. Ent.* 394. 17. *

Habitat Cajennae. *Dr. Mallet.*

elevata. 26. *F. nigra*, thorace bidentato, abdominis petiolo subtus unidentato. *Syst. Ent.* 394. 18. *

Habitat in India orientali.

attelaboides. 27. *F. thorace bispinoso nigra*, pedibus ferrugineis, capite postice attenuato. *Syst. Ent.* 394. 19. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Ammon. 28. *F. thorace bispinoso*, squama petiolari spinis duabus incuruis. *Syst. Ent.* 394. 20. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*