

*Seb. Musf.* 4. tab. 99. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

*gulosæ*. 34. F. rufa, abdomine apice nigro primo segmento contracto, mandibulis porrectis. *Syst. Ent.* 395. 25. \*

Habitat in noua Hollandia. *Musf. Dom. Banks.*

*hamata*. 35. F. ferruginea, capite maximo pallido, mandibulis porrectis hamatis.

Habitat Caiennæ. *Musf. Dom. Feats.*

Media. Caput maximum subrotundum, pallidum, nitidum, basi vtrinque spina parua, conica. Maxillæ porrectæ, capite longiores, hamatæ, acutæ, nigrae. Antennæ nigrae basi ferrugineæ. Corpus ferrugineum thorace inermi petioloque binodoso.

*haemato-* 36. F. squama petiolarum conica acutissima, capite subdidymo, mandibulis porrectis. *Syst. Ent.* 395. 26. \* *Linn. Syst. Nat.* 2. 965. 17.

*Formica maxillofa* alata nigro fusca, pedibus maxillisque porrectis rufis, squama petiolarum conica. *Degeer Inf.* 3. 601. 2. tab. 31. fig. 3.

Habitat in America meridionali.

*maxillo-* 37. F. thorace sexdentato, capite flauescente, mandibulis longitudine capitis. *Syst. Ent.* 396. 27. \*

*fa.*

Habitat in India orientali. *Musf. Dom. Banks.*

## 125. M V T I L L A.

*occidentalis*. 1. M. coccinea, abdomine cingulo nigro. *Syst. Ent.* 396. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 1.

*Petiv. Musf.* 404.

— — *Gazoph.* tab. 13. fig. 10.

— — *Filic.* 404. tab. 11. fig. 4.

*Catesb. Carol.* 3. p. 15. tab. 15.

*Sulz. Inf.* tab. 19. fig. 9.

Habitat in America septentrionali.

Aculeus reconditus, pectorius.

*antigua-* 2. M. coccinea, abdominis apice nigro, strigis albis. *Syst. Ent.* 396. 2. \*

*jis.*

Habitat in Antigua insula. *Dom. Drury.*

*americana-* 3. M. atra, abdomine maculis quatuor flauescens tribusque albis. *Syst. Ent.* 396. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 2.

*na.*

*Sphex*