

- Form.) and lycaenids (Lepidoptera: Lycaenidae). Ethology 80: 71–80.
- Forel, A.  
 1893. Formicides de l'Anteille St. Vincent. Trans. Entomol. Soc. London, Part IV: 333–418.
- Flanders, S. E.  
 1957. The complete interdependence of an ant and a coccid. Ecology 38: 535–536.
- Gaume, L., D. McKey, and S. Terrin  
 1998. Ant-plant-homopteran mutualism: how the third partner affects the interaction between a plant-specialist ant and its myrmecophyte host. Proc. R. Soc. London 265: 1–7.
- Gaume, L., D. Matile-Ferrero, and D. McKey  
 2000. Colony foundation and acquisition of coccid trophobionts by *Aphomomyrmex afer* (Formicinae): co-dispersal of queens and phoretic mealybugs in an ant-plant-homopteran mutualism. Insectes Soc. 47(1): 84–91.
- Grimaldi, D.  
 1995. The age of Dominican amber. In K. B. Anderson and J. C. Crelling.), Amber, resinite, and fossil resins: 203–217. Washington DC: Amer. Chem. Soc. Symposium.
- Grimaldi, D., and D. Agosti  
 2000. A formicine in Cretaceous amber from New Jersey (Hymenoptera: Formicidae), and early evolution of the ants. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97(25): 13678–13683.
- Grimaldi, D., D. Agosti, and J. M. Carpenter  
 1997. New and rediscovered primitive ants (Hymenoptera: Formicidae) in Cretaceous amber from New Jersey, and their phylogenetic relationships. Am. Mus. Novitates 3208: 43 pp.
- Heie, O.  
 1987. Paleontology and phylogeny. In P. Harrewijn and A. K. Minks (eds.), Aphids: their biology, natural enemies and control 2: 36–391. Amsterdam: Elsevier.
- Hölldobler, B., and E. O. Wilson  
 1990. The ants. Cambridge: Harvard Univ. Press.
- Iturralde-Vinent, M., and R. D.E. MacPhee  
 1996. Age and paleogeographic origin of Dominican amber. Science 273: 1850–1852.
- Klein, R. W., D. Kovac, A. Schellerich, and U. Maschwitz  
 1992. Mealybug-carrying by swarming queens of a Southeast Asian bamboo-inhabiting ant. Naturwiss. 79: 422–423.
- Klein, R. W., D. Kovac, U. Maschwitz, and A. Buschinger  
 1994. *Tetraponera* sp. Nahe *attenuata* F. Smith, eine südostasiatische Bambusameise mit ungewöhnlichen Anpassungen an ihren Lebensraum. Mitt. Dtsch. Ges. Angew. Entomol. 9: 337–341.
- Konova, E.  
 1972. A new aphid family (Homoptera: Aphidoidea) from the Upper Cretaceous of the Taimyr. Entomol. Obozr. Moskva 54: 795–807.
1976. Extinct aphid families (Homoptera: Aphidoidea) of the Late Cretaceous. Paleontol. Zh. / Moskva 3: 117–126.
1977. New species of aphids (Homoptera, Aphidoidea) from the Upper Cretaceous deposits of Taimyr. Entomol. Rev. 56: 588–600.
- Koteja, J.  
 1985. Coccids (Horm. Coccinea) of Baltic amber. Wiad. Entomol. (Warsaw) 6: 195–206. [In Polish]
1987. Current state of coccid paleontology. Bol. Lab. Entomol. agraria Filippo Silvestri 43(suppl.): 29–34.
1989. *Inka minuta* gen. et sp. n. (Homoptera, Coccinea) from Upper Cretaceous Taymyrian amber. An. Zool. 43: 77–101.
- Lutz, H.  
 1986. Eine neue Unterfamilie der Formicidae (Insecta: Hymenoptera) aus dem mittel-eozänen Olschiefer der "Grube Messel" bei Darmstadt (Deutschland, S-Hessen). Senckenb. Lethaea 67 (1–4): 177–218.
- Maschwitz, U.  
 1990. Der eine lebt vom anderen—Lebensgemeinschaften von Ameisen. Forsch., Mitt. DFG 2(90): 16–19.
- Maschwitz, U., and M. Dill  
 1998. Migrating herdsman of Mount Kinabalu. Borneo 4: 32–41.
- Maschwitz, U., and H. Hänel  
 1985. The migrating herdsman *Dolichoderus (Diabolus) cuspidatus*: an ant with a novel mode of life. Behav. Ecol. Sociobiol. 17: 171–184.
- Maschwitz, U., and R. Klinger  
 1974. Trophobiotische Beziehungen zwischen Wanzen und Ameisen. Insectes Soc. 21: 163–166.
- Maschwitz, U., K. Dumpert, and K. R. Tuck  
 1986. Ants feeding on anal exudate from tortricid larvae: a new type of trophobiosis. J. Nat. Hist. 20: 1041–1050.