



Figura 3. *Octostruma inca*. A. Cabeza en vista frontal. B. Mesosoma y peciolo en vista lateral.

y relativamente largo; nodo subtriangular y aproximadamente tan ancho como largo, caras anterior y dorso-posterior encontrándose en un ángulo redondeado, proceso anteroventral corto, romo y oblicuo. Postpeciolo corto, con su superficie dorsal ligeramente convexa. Gaster ancho y excavado semicircularmente en su parte media para recibir al postpeciolo.

Mandíbulas lisas y brillantes, con punteaduras esparcidas. Escapos densamente punteados. Cabeza, mesosoma, peciolo, postpeciolo y gaster densamente cubiertos de punteaduras gruesas.

Cabeza con 8 pelos erectos: 6 en el vertex y occipucio, y 1 inmediatamente detrás de cada ojo. Dorso del mesosoma con 2 pelos erectos en el promesonoto. Peciolo sin pelos erectos. Postpeciolo con 2 pelos erectos. Gaster con numerosos pelos erectos. Pilosidad plumosa apesada muy esparcida en todo el cuerpo, más abundante en el gaster.

Color predominantemente pardo negruzco, mesosoma con visos rojizos en las partes laterales. Mandíbulas, funículos y patas contrastantemente claros, pardo amarillentos.

HEMBRA: Desconocida.

MACHO: Desconocido.

VARIACIONES. Los parátipos presentan una coloración pardo ferruginosa mucho más clara, pero esta variación puede significar que se trata obreras jóvenes, que tienden a ser más pálidas. Los pelos erectos claviformes varían también en cantidad y distribución a lo largo del cuerpo.

ETIMOLOGÍA. Del griego stenos (στενός: estrecho) + skapo, en referencia a los escapos delgados, sin ensanchamiento lobiforme cerca a su base.

Clave para las obreras de *Octostruma* en Colombia

1. Escapos antenales delgados, sin ensanchamiento en forma de lóbulo cerca a la base. Cabeza ligeramente más larga que ancha (Figs. 2D y 3A), índice cefálico < 1.00. 2
- 1'. Escapos antenales con un ensanchamiento en forma de lóbulo cerca a su base (Figs. 1A, 1D, 2A y 2C). Cabeza ligeramente más ancha que larga, índice cefálico > 1.00. 3
- 2(1). Espacio entre el borde anterior del cípeo y las mandíbulas cerradas bastante grande, de tal forma que el labro es perfectamente apreciable en vista frontal (Fig. 2D). Ojos pequeños, con