



Fig. 1. – *Camponotus (T.) festai* Emery, de gauche à droite et de haut en bas : écaille du mâle, tête du mâle en vue dorsale, genitalia mâles en vue dorsale, mâle, femelle et ouvrière de profil, tête d'ouvrière.

Redescription de la femelle

Matériel examiné : une vingtaine de femelles capturées avec quelques mâles et des ouvrières identiques à celles décrites ci-dessus, 2.VIII.1981, à Kfour, au même endroit que les ouvrières précédentes. Le matériel est déposé au MNHN, Paris, sous le même numéro que les ouvrières (collection en alcool).

Tout le corps est uniformément coloré d'un rouge vineux à marron noirâtre, plus sombre sur la tête, le scape, le dessus du pronotum et les trois derniers segments du gastre. Côtés latéraux du thorax, pattes, écailles et partie antérieure du premier segment du gastre marron roux ; tarsi plus clairs. La pilosité est composée de poils dressés roux fauve ; leur nombre et leurs longueurs sont variables selon leur emplacement sur les différentes régions du corps. Les plus longs ne dépassent pas 0,6 mm. Sur le clypéus, la frange antérieure est de 16 à 18 poils ; une trentaine sont répartis sur toute sa surface. Sous la tête, on dénombre une quarantaine de poils. Ils manquent autour des yeux mais on en compte 6 à 8, courts et obliques sur les joues, et 4 rangées de 10 poils à peu près entre le bord postérieur du clypéus et les ocelles. Sur le vertex et entre les lames frontales, on en dénombre une dizaine. Les poils manquent sur les flancs du thorax ; une cinquantaine sont sur le dos et ils sont plus nombreux sur les pattes et le gastre.