

### Description de la femelle

La coloration générale de la tête, du thorax, de l'écaille et du gastre est noir sombre ; mandibules rouge-marron foncé ; antennes, pattes et extrémités postérieures des segments de l'abdomen marron plus clair. Tout le corps est lisse sauf les mandibules qui sont longitudinalement striées. Ponctuation fine et éparse sur la tête, le clypéus et l'épinotum. Poils dressés jaunâtres dont le nombre et la longueur varient selon les différentes régions du corps. Ils manquent, entre les yeux, à l'insertion des mandibules, sur les côtés latéraux du thorax et sur les faces antérieure et postérieure de l'écaille. On compte 6 à 8 poils courts sous chaque œil ; ils deviennent plus longs (0,4 à 0,5 mm) sous la tête, sur le vertex, l'aire frontale, l'épistome, le dos, la frange de l'écaille, le milieu et le bord postérieur des segments abdominaux et sur certaines parties des pattes et des mandibules. Pas de psammophores. On compte une quarantaine de poils sur l'épistome, une cinquantaine sur la partie supérieure de la tête. 65 à 70 sur le dos, une douzaine sur l'écaille et une trentaine sur chaque segment du gastre. Les antennes sont couvertes par une pubescence. Les tibias des pattes métathoraciques portent une vingtaine de rangées de poils courts et obliques. Une pubescence épaisse et clairsemée se rencontre aussi sur tout le corps sauf sur les flancs du mésonotum, ce qui donne à la femelle un aspect semi-luisant.

*Tête* presque aussi longue que large, bord postérieur rectiligne non rétréci. Les côtés latéraux se rapprochent légèrement en avant des yeux, lesquels sont placés un peu en arrière de leur milieu. Aire frontale losangique, mal limitée postérieurement. Scape dépassant le bord postérieur du vertex. Mandibules triangulaires sillonnées en longueur et portant 7 dents. La tête est moins luisante que le reste du corps.

*Thorax* à peu près la même largeur que la tête, en vue dorsale. Pronotum convexe, mésonotum triangulaire à angles arrondis, bombé en dessus. L'épinotum a à peu près la même taille et la même forme que le segment précédent. Vue de profil, pronotum et mésonotum sont presque en ligne droite ; ces deux segments forment une échancrure en escalier. La face déclive de l'épinotum est égale à sa face basale : elles forment entre elles un angle arrondi de 110° à peu près. Les sutures entre les différents segments du thorax sont nettes.

Longueur totale de l'aile antérieure : 12,6 mm ; cellule radiale allongée et étroite ; couleur hyaline avec les parties supérieures des ailes teintées légèrement de jaune, les nervures sont marron jaunâtre.

*L'écaille*, vue de profil, est droite, mince, à bord supérieur aigu, à face antérieure légèrement convexe et à face postérieure plane, présentant à son bord supérieur une échancrure large peu profonde, lui donnant à peu près un aspect bilobé : c'est un caractère distinctif de cette espèce. La dissection d'un cocon de femelle de Baïdar a montré la présence de cette écaille bilobée.

*Mensurations* réalisées sur plusieurs individus, mais, vu la similitude des résultats, nous nous sommes contentés de reproduire dans le tableau suivant les résultats de 4 femelles ailées de Mahrouqa :

Longueur totale	13,8	13,8	13,6	13,2
Longueur tête	2,5	2,5	2,5	2,5
Largeur tête	2,4	2,4	2,4	2,4
2 <sup>e</sup> tibia	1,7	1,7	1,7	1,6
3 <sup>e</sup> fémur	2,7	2,7	2,7	2,6

### Description du mâle

Faite d'après 3 mâles dont la longueur du corps est respectivement : 6,2, 6,3 et 6,8 mm. Chez les trois individus, la tête au niveau des yeux est aussi large (0,9 mm) que longue. Largeur de la tête au niveau des mandibules égale à 0,6 mm.

Tout le corps est faiblement réticulé. Couleur générale d'un noir semi-luisant, avec le scape, le premier article du funicule et les pattes (sauf les tarsi) d'un marron noirâtre ; les articles du funicule, les palpes maxillaires, les tarsi et les genitalia sont jaunes. Poils jaunâtres plus ou moins dressés. Les plus longs atteignent 0,4 à 0,5 mm. Ils sont également répartis sur tout le corps, mais manquent sur les côtés latéraux du thorax. Le pronotum porte des fossettes piligères dorsalement et antérieurement. Les joues portent 7 à 8 poils ; l'espace entre les yeux est hérissé de longs poils. Clypéus légèrement caréné, sa partie antérieure est un lobe semi-circulaire. Il porte sur toute sa surface de longs poils hérissés. Yeux placés un peu en arrière de la moitié de la tête. Scape de 1,2 mm, premier article du funicule un peu plus globuleux que les autres ; pubescence couvrant tout le funicule.

*Thorax* ressemblant à celui de la femelle. Ecaille bilobée, courte et relativement épaisse.

*Appareil génital* bien développé, proéminent et rétractile. Plaque sous-génitale en écusson