

8. **Myrmica sabuleti** MEIN.

P —

UG Scuol, Ramosch, Ardez, La Strada

CH Vom Tiefland bis ins Hochgebirge.

AV Fast in ganz Europa, von Sizilien bis Skandinavien, häufig.

Leptothorax MAYR9. **Leptothorax (Mychothorax) acervorum** F.(inklusive Form *nigrescens* RUSZY).

P Il Fuorn, Alp Schera, Stabelchod, Alp Grimmels, Val Cluozza.

UG Zernez, Ofenpasshöhe, Alp Buffalora, Scuol, Pradella.

CH In der ganzen Schweiz weit verbreitet, vom Tiefland bis ins Hochgebirge bis über 3000 m. Dort meist in Holz, hier unter Stein.

AV In ganz Europa bis Ostasien.

10. **Leptothorax (Mychothorax) muscorum** NYL.

P Il Fuorn, Alp Schera.

UG Ramosch, Pradella usw.

CH In der ganzen Schweiz, vornehmlich im Gebirge, in Moos, Felsspalten, unter Steinen usw.

AV Holarktisch.

11. **Leptothorax kutteri** BUSCHINGER(obligater Sozialparasit bei *Lept. acervorum*) ohne ♀♀-Kaste.

P —

UG Tschierv (leg. BUSCHINGER).

CH Wallis (Saas Fee, Bellwald, St-Luc usw.).

AV Mitteleuropa, wahrscheinlich soweit verbreitet wie Wirtsart. Toblach (Südtirol), Nürnberger Reichswald usw.

12. **Leptothorax tuberum** (F.) NYL.(*L. nigriceps* part. aut. nec MAYR).

P Alp Schera, Val Cluozza.

UG Ofenpasshöhe, Zernez, Scuol, Ramosch.

CH Vor allem im Gebirge bis über 2000 m recht häufig unter Steinen, in Moos, Holz usw. in der ganzen Schweiz.

AV Mittel- und Nordeuropa.

Doronomyrmex KUTTER(obligater Sozialparasit bei *Lept. acervorum*. ♀♀-Kaste fehlt).13. **Doronomyrmex pacis** KUTTER

P Val Cluozza, Alp Schera.

UG Ofenpasshöhe, Tschierv.

CH Bis heute nur im Hochgebirge bei *L. acervorum*. Wallis (Saas Fee, Binntal) usw.

AV Alpen und Ostalpen (Dolomiten) usw.