

**Harpagoxenus FOREL**

(obligater Sozialparasit mit Dulosis bei *Lept. acervorum*).

14. **Harpagoxenus sublaevis NYL.**

P Il Fuorn.

UG Alp Buffalora, Ofenpasshöhe, Zernez, Carolina.

AV Nord- und Mitteleuropa, im Süden bis zu den Pyrenäen, Apennin usw. Die Art darf im ganzen Verbreitungsgebiet der Wirtsart erwartet werden.

**Formicoxenus MAYR**

(Gastameise bei *Formica* der *rufa*-Gruppe).

15. **Formicoxenus nitidulus MAYR**

P Buffalora bei *Formica aquilonia*.

UG Scuol, Pradella.

CH In der Schweiz bis 2300 m respektive soweit als *Formica*-Populationen vorkommen.

AV Von Nord- und Westeuropa, Norditalien usw. bis weit nach Osten und Sibirien respektive soweit die Wirtsart verbreitet ist.

**Epimyрма EMERY**

(obligater Sozialparasit bei *Leptothorax tuberum*).

16. **Epimyрма stumperi KUTTER**

P —

UG Tschierv (leg. BUSCHINGER).

CH Saas Fee.

**Tetramorium MAYR**17. **Tetramorium caespitum L.**

P Il Fuorn, Alp Schera, Val Cluozza, Alp Trupchun.

UG Zernez, Ofenpasshöhe, Cinuos-chel, Scuol, Pradella, Ramosch usw.

CH In der ganzen Schweiz weit verbreitet, von der Ebene bis ins Hochgebirge über 2400 m.

AV Holarktisch.

**Anergates FOREL**

(obligater Sozialparasit bei *Tetramorium caespitum*). ♀♀-Kaste fehlt.

18. **Anergates atratulus SCHENCK**

P —

UG Scuol.

AV Als permanenter Sozialparasit von *Tetramorium* begleitet *Anergates* ihre Wirtsart von der Ebene bis ins Hochgebirge über 2000 m.