

UNTERFAMILIE FORMICINAE

Camponotus MAYR

19. **Camponotus herculeanus** L.
 P Il Fuorn, Alp Schera, Alp Grimmels, Val Cluozza, Val Tantermozza usw.
 UG Zernez, Ramosch, Val Sinestra usw.
 CH Vom Flachland bis zur Baumgrenze respektive bis 2000 m, weit verbreitet. Lebt in Holz.
 AV Holarktisch.
20. **Camponotus ligniperda** LATR.
 P –
 UG Zernez, Mustair, Scuol, Pradella, Sur En, Ramosch, Martina usw.
 AV Europa, fehlt in England. In der Ebene häufiger, im Gebirge bis über 1600 m.

Lasius F.

21. **Lasius (Dendrolasius) fuliginosus** LATR.
 P –
 UG Zernez, Carolina, Scuol, Sent, Ramosch usw.
 CH In der ganzen Schweiz weit verbreitet, von der Ebene bis 1800 m (Saas Fee).
 AV Paläarktisch, von England bis Japan.
22. **Lasius niger** L.
 P –
 UG Scuol, Pradella, Sur En, ganzes Unterengadin.
 CH Eine der gemeinsten und verbreitetsten Ameisen der Schweiz, bis 1600 m (Zermatt).
 AV Holarktisch.
23. **Lasius alienus** FOERST.
 P Il Fuorn.
 UG Flin, Carolina, Scuol, Pradella, Ramosch.
 CH Weitverbreitet in der Schweiz, an eher trockeneren Orten. Im Gebirge bis 1800 m.
 AV Holarktisch.
24. **Lasius (Chthonolasius) umbratus** NYL.
 P Val Cluozza.
 UG Zernez usw.
 CH In der Schweiz weit verbreitet und häufig, von 200 m bis 1800 m. Unterirdisch lebend in Erde und Holz, auch Karton bauend.
 AV Holarktisch.
25. **Lasius (Chthonolasius) rabaudi** BONDR.
 P Il Fuorn.
 UG Schuls, Pradella, Ramosch, Münstertal usw.
 CH Weit verbreitet, in Berglagen scheinbar häufiger. Unterirdisch Kartonnester bauend.
 AV Paläarktisch.