

32. **Formica (Serviformica) selysi** BONDR.
 P Il Fuorn.
 UG Scuol, Pradella, Innufer bis Landesgrenze.
 CH In der Schweiz an den Ufern der Landquart, im Haupttal des Wallis, in Derborence usw. Sehr volkreiche, polykalische Kolonien vor allem in sandigen Flussauen. Wird leicht mit *F. cinerea* MAYR verwechselt.
33. **Formica rufa** L.
 P –
 UG Carolina, Scuol, Sent, Flan, La Drossa, Sta. Maria usw.
 CH Die rote Waldameise im Original ist wohl in der ganzen Schweiz weit verbreitet, doch fehlt sie oder dürfte nur sehr selten im Oberengadin zu finden sein. Im untern Tale aber ist sie heimisch. Im Parke selbst aber nicht oder vielleicht noch nicht nachgewiesen.
 AV Vor allem im mittleren Europa und auch in Südengland, in Skandinavien, wie auch selten auf der iberischen Halbinsel, dem Balkan und der Türkei, nach Osten im ganzen paläarktischen Raum bis zum Baikalsee.
34. **Formica polyctena** FOERSTER
 P –
 UG Die kleine rote Waldameise hat im Inntal die Gegend von Scuol erreicht, bildet dort aber nicht die üblichen Grosspopulationen des Flachlandes. Scuol, Ardez usw.
 CH Vor allem im Mittelland weit verbreitet, im Jura und in den Voralpen bis etwa 1600 m. Fehlt in den Hochalpen und im Tessin.
 AV Mitteleuropa, Skandinavien und paläarktisches Asien.
35. **Formica lugubris** ZETT.
 P Il Fuorn, Alp Schera, Alp Grimmels, Alp Buffalora, Val Cluozza, Val Tantermozza, Stabelchod, Val Minger, Val Trupchun usw.
 UG Zernez, Carolina, Scarl, Ramosch, Sur En, Scuol, Ofenpass, Süs usw.
 CH In der Schweiz vor allem im ganzen Alpen- und Voralpengebiet und im Jura bis über 2000 m, im Mittelland seltener.
 AV Vor allem im West- und Ostalpengebiet, in England und Schottland und Skandinavien, im Osten durch das ganze paläarktische Gebiet bis Japan.
36. **Formica aquilonia** YARROW
 P Punt la Drossa, Il Fuorn, Champlönch, Alp Grimmels, Scarl, Val Cluozza, Val Tantermozza, Stabelchod usw.
 UG Carolina, Val Plavna, Zernez usw.
 CH Bis heute in der Schweiz nur im Engadin nachgewiesen.
 AV Ostalpen, Schottland, Skandinavien, weit nach Osten bis über den Baikalsee verbreitet.
37. **Formica pratensis** RETZ.
 (= *F. nigricans* EM.)
 P –
 UG Scuol, Ramosch, Sent usw.
 CH In der Schweiz häufig in Mittelland, Voralpen, Tessin.
 AV Mitteleuropa, Apennin, Skandinavien, durch das ganze paläarktische Gebiet der UdSSR, Kirgisische SSR.