

具短茸毛。体黑色。触角柄节基部和端部、鞭节、上颚和足胫节暗红褐色；足跗节和后腹部末端黄褐色。

分布 广西(藤县)、云南、广东、海南、台湾；东南亚。

(23) 中华细猛蚁 *Leptogenys chinensis* (Mayr 1870) (图 49~50)

Lobopelta chinensis Mayr, 1870 Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 20: 965.

Leptogenys chinensis Mayr; Forel, 1900 Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13: 313.

工蚁 TL 6.7~6.8, HL 1.30~1.33, HW 0.79~0.82, CI 60~61, SL 1.47~1.49, SI 181~186, PW 0.76~0.79, AL 2.09~2.22, ED 0.33~0.34.

头卵圆形，在复眼之后缩窄。上颚狭长，端部弯而尖。唇基三角形，端缘平截，具中央纵脊。触角柄节 1/3 以上超过后头缘；鞭节第 2 节长为第 1 节的 2 倍以上。复眼大，稍凸。前胸背板宽，稍凸；中胸背板向后降低；并胸腹节斜面近平截。结节顶端钝圆，后面平直，高约为前面的 2 倍，长约为宽的 2 倍。腹柄下突小。后部长卵形，基二节间缢缩明显。螫针发达。




图 49~50 中华细猛蚁 *Leptogenys chinensis* (Mayr) (工蚁)

49. 头部正面观 50. 体侧面观

上颚具稀疏刻点；唇基和头部两额脊之间具细纵刻纹；头部复眼之前具细密刻点。并胸腹节侧面基部具少许纵刻纹，斜面具细横刻纹；体其余部分光亮。立毛色浅，稀疏，仅在后腹部末端较密。茸毛仅存在于触角和足跗节。体黑色，在一定光线下可见蓝紫色光泽。上颚、触角鞭节、足胫跗节栗红色。后腹部末端褐黄色。

分布 广西(桂林、梧州、钦州、防城)，福建、台湾；印度、斯里兰卡。

(24) 明卿氏细猛蚁 *Leptogenys minchinii* Forel 1900 (图 51~52)

Leptogenys minchinii Forel, 1900 Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13: 308.

工蚁 TL 5.8, HL 1.19, HW 0.75, CI 63, SL 1.26, SI 168, PW 0.70, AL 1.74, ED 0.22.

本种与中华细猛蚁十分相似。但体较小；唇基前缘中部尖突，不平截；头顶在复眼之后具刻点；触角柄节较短，柄节比小于 170；中胸侧板下半部具横刻纹。体红褐色；上颚、触角鞭节、足胫跗节和后腹部末端橙黄色。

分布 广西(金秀)，福建、香港、澳门；印度、缅甸、孟加拉国。