

95, PW 2.45~2.80, AL 4.85~5.30, ED 0.50~0.65.




图 60~61 红足厚结蚁 *Pachycondyla rufipes* (Jerdon) (工蚁)

60. 头部正面观 61. 体侧面观

头长大于宽, 前部略窄于后部, 两侧缘及后头缘直。上颚咀嚼缘具不明显的齿。唇基横形, 中部凸, 具中脊。触角 12 节, 柄节刚到达后头角。复眼较小, 位于头侧中线之前。并腹胸厚, 各节等高; 前-中胸背板缝清晰, 中-并胸腹节缝消失; 并胸腹节斜面凹, 边缘明显。结节厚而高, 侧面观长方形, 背面观前面凸, 后面凹, 背缘具 1 列齿。腹柄下突三角形, 后下角齿状。后腹部粗大, 基二节间缢缩明显。螯针常伸出。

上颚具细纵刻纹和稀疏刻点; 头、并腹胸和结节具粗密刻点; 并胸腹节斜面和结节背面光亮; 后腹部基部 2 节具粗纵刻纹, 刻纹间具粗刻点; 其余各节刻点细密。全身密被黄色直立、亚直立细毛和丰富茸毛。体黑色。上颚、触角、足和后腹部末端红褐色。

分布 广西各地, 西藏、云南、贵州、广东、香港; 东南亚。

(29) 敏捷厚结蚁 *Pachycondyla astuta* F. Smith 1858 (图 62~63)

Pachycondyla astuta F. Smith, 1858 Cat. Hym. Inse. Brit. Mus. 6: 107.

Ectomyrmex astuta (F. Smith); Bingham, 1903 Faun. Brit. Ind. Hym. 2: 86.

Bothroponera astuta (F. Smith); Taylor & Brown, 1985 Zool. Cat. Aust. 2: 21.

Pachycondyla astuta F. Smith; Bolton, 1995 New Cat. Ant World: 303.

工蚁 TL 9.5~15.2, HL 2.30~3.37, HW 2.05~3.13, CI 88~92, SL 1.80~3.00, SI 88~95, PW 1.44~2.02, AL 3.03~4.66, ED 0.28~0.40.




图 62~63 敏捷厚结蚁 *Pachycondyla astuta* F. Smith (工蚁)

62. 头部正面观 63. 体侧面观