

头圆,头部略背腹扁平,侧缘微凸,边缘明显,后头缘深凹,后头角钝角状。上颚宽三角形,咀嚼缘具6~8齿。唇基窄,中部凸,前缘完整,缺中脊。触角柄节略超过后头角。复眼较小,位于头侧中线之前。并腹胸厚实,背面稍凸;前胸背板前缘圆凸,前侧角略呈直角;前-中胸背板缝清晰,中-并胸腹节缝微现凹痕;并胸腹节基面短于斜面,二者连接处圆滑,两侧具边缘。结节侧面观前面平直,后面端部向前倾斜;背面观前面凸,后面平。腹柄下突三角形,前下侧钝角形。后腹部粗大,基二节间缢缩明显。螫针伸出。

上颚具细纵刻纹和稀疏粗刻点;头部和并腹胸具密集刻纹;头部纵刻纹向后发散;前胸背板前缘刻纹横形,其后部以及中、并胸腹节和结节具纵刻纹;并胸腹节斜面和结节背面具横刻纹;后腹部具细密刻点,其中第1节刻点较粗。立毛黄色,细而稀疏。短茸毛密集,遍布全身。体黑褐色至黑色。上颚、触角鞭节、足和后腹部末端暗红褐色。

分布 广西各地、北京、山东、江苏、上海、江西、湖北、湖南、安徽、云南、贵州、四川、浙江、福建、广东、海南、台湾、香港、澳门;亚洲、大洋洲。

(30) 安南厚结蚁 *Pachycondyla annamita* (Andre 1892)

Ponera annamita Andre, 1892 *Revue Ent.* 11: 48.

Bothroponera annamita (Andre); Dalla Torre, 1893 *Cat. Hym. Lipsiae* 7: 35.

Ectomomyrmex annamita (Andre); Forel, 1900 *Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc.* 13: 322.

Pachycondyla annamita (Andre); Bolton, 1995 *New Cat. Ants World*: 302.

工蚁 TL 6.6, HL 1.47, HW 1.32, CI 89, SL 1.10, SI 83, PW 0.94, AL 2.07, ED 0.17.

本种与敏捷厚结蚁 *P. astuta* Smith 相似。但体远小于后者;触角柄节不到达后头角,柄节比 83;体刻纹精细。

雌蚁 TL 7.3 mm。与工蚁相似,但头顶具 3 单眼;中胸背板及小盾片发达;具翅。

分布 广西(临桂、合浦),云南、四川、浙江、福建;印度、缅甸、马来西亚、澳大利亚。

(31) 夏普氏厚结蚁 *Pachycondyla sharpii* Forel 1899 (图 64~65)

Pachycondyla sharpii Forel, 1899 *Aculeata*: 121.

工蚁 TL 5.2, HL 1.25, HW 1.03, CI 82, SL 0.94, SI 91, PW 0.88, AL 1.66, ED 0.12.




图 64~65 夏普氏厚结蚁 *Pachycondyla sharpii* Forel (工蚁)

64. 头部正面观 65. 体侧面观

头长大于宽,两侧缘近平直,后头缘微凹。上颚具 7 齿,第 2、4、6 齿较小。唇基窄,中部凸,中脊明显。触角柄节刚到达后头角。复眼较小。并腹胸背面平直;前-中胸背板缝清晰,中-并胸腹节缝不