

明显；并胸腹节形状与上一种相似。结节厚，前、后面近平行，端部略向后倾斜；背面观前面凸，后面略凹。腹柄下突半圆形。后腹部粗长，基二节间缢缩明显，第1节基部平截。螯针发达。

上颚具稀疏刻点和隐约可见的纵刻纹，较光亮。并胸腹节斜面及结节前、后面具密集横刻纹；体其余部分具密集粗刻点。立毛细短而稀疏，但在唇基和后腹部末端较长且丰富。茸毛被密集。体暗红褐色。上颚、唇基、触角、足和后腹部末端红褐色。

分布 广西(百色市)；夏威夷。

(32) 黄足厚结蚁 *Ponera luteipes* (Mayr 1862) (图 66~67)

Ponera luteipes Mayr, 1862 Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 12: 722.

Brachyponera luteipes (Mayr); Bingham, 1903 Faun. Brit. Ind. Hym. 2: 101.

Pachycondyla luteipes (Mayr); Brown, 1995 [in Bolton] New Cat. Ants World; 307.

工蚁 TL 3.0~4.3, HL 0.78~1.00, HW 0.69~0.87, CI 82~89, SL 0.66~0.88, SI 92~96, PW 0.41~0.72, AL 1.03~1.13, ED 0.11~0.13.

头长大于宽，后部宽于前部，后头缘宽凹或近平直，后头角钝圆。上颚三角形，咀嚼缘具9齿。唇基横形，前缘凸，中央微凹，无中脊。触角柄节超过后头角。复眼中等大小，位于头侧之前。前胸背板凸；中胸背板前面高，向后倾斜；前-中胸背板缝明显；中-柄胸腹节缝处宽角形凹陷；并胸腹节侧扁，基面平直或微凸，后端宽于前端，与斜面等长或略长于斜面。足中等长，后足胫节具2距；跗爪简单。结节高而厚，前面凸，后面平，顶端稍前倾。腹柄下突三角形，后下角较尖。后腹部长卵形，第1节前面平截，基二节间轻度缢缩。




图 66~67 黄足厚结蚁 *Ponera luteipes* (Mayr) (工蚁)

66. 头部正面观 67. 体侧面观

上颚、唇基和体具密集刻点。头部刻点粗密；前胸背板、结节和后腹部刻点较细弱；并胸腹侧面较光亮。立毛稀疏。茸毛丰富。体黑色、黑褐色或红褐色。上颚、触角和足黄褐色至红褐色。

雌蚁 与工蚁相似。但体明显较大；复眼较大；具3单眼；具翅。

分布 广西(百色、天峨、天等、上思、大明山、龙州、防城、十万大山、弄岗、龙虎山)，北京、河北、江苏、上海、安徽、湖北、湖南、云南、四川、浙江、福建、广东、海南、台湾、香港；亚洲、大洋洲。

(33) 中华厚结蚁 *Pachycondyla chinensis* (Emery 1895)

Ponera nigrita subsp. *chinensis* Emery, 1895 Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova. (2)14[34]: 460.

Euponera (*Brachyponera*) *chinensis* Emery, 1909 Deuts. Ent. Zeitschr.; 367.

Brachyponera chinensis (Emery); Brown, 1958 Acta Hymenopterologica 1: 22.

Pachycondyla chinensis (Emery); Brown, 1995 In Bolton: New Cat. Ants World; 304.