

(34) 槽结粗角猛蚁 *Cerapachys sulcinodis* Emery 1889 (图 68~69)

*Cerapachys sulcinodis* Emery, 1889 *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova* 27: 493.

*Cerapachys risii* Forel, 1892 *Hist. Phys. Nat. Polit.* 20(2): 244.

*Cerapachys butteli* Forel, 1913 *Zool. Jahrb. Syst.* 36: 3.

工蚁 TL 6.1~7.1, HL 1.17~1.33, HW 1.00~1.17, CI 80~87, SL 0.73~0.85, SI 72~77, PW 0.69~0.79, AL 1.58~1.84, ED 0.22~0.25.

头矩形, 前部稍凸, 后面略窄, 两侧缘较平直; 后头缘微凹, 后头角呈角状。上颚宽三角形, 咀嚼缘不具齿。唇基窄, 下陷。额脊高, 触角窝裸露, 外侧有突起的侧脊。触角粗短, 12节; 柄节不到达后头角; 鞭节向端部增粗, 端节长。复眼小, 位于头侧中线之后; 在复眼下缘至上颚着生处有一浅纵沟。并腹胸较粗短, 背面稍凸后部稍窄于前部; 前胸背板前缘具横脊。前-中胸背板缝和中-并胸腹节缝均消失; 并胸腹节斜面陡, 其上方和两侧具明显的脊。结节前面平直, 后面和背面圆凸。腹柄下突长, 指状; 其前缘垂直, 端部平截, 后缘微呈弧形下凹。后腹部细长, 基二节间缢缩宽; 臀板中部下凹, 边缘具褐色齿 20 余个。螫针伸出。

上颚具细纵刻纹和稀疏粗刻点; 头和并腹胸光亮, 仅具稀疏粗刻点; 结节刻点较密, 背面具纵刻纹, 其中央具一条宽而光亮的纵沟; 后腹部光亮。全身具丰富的黄色立毛。茸毛稀少, 仅在触角鞭节较丰富。体黑色。头部两侧、上颚、唇基、触角、足、后腹部腹面和末端红褐色。

分布 广西(花坪、猫儿山), 西藏、四川、贵州、香港; 东南亚。




图 68~69 槽结粗角猛蚁 *Cerapachys sulcinodis* Emery(工蚁)

68. 头部正面观 69. 体侧面观