

头卵圆形,长大于宽。上颚具6齿,闭合后与唇基前缘无缝隙。唇基短。额脊相距很近。触角10节。前、中胸背板凸;并胸腹节基面与斜面连接处钝圆角形。结节前面倾斜,后面陡直,背面凸圆。腹柄下突后下角尖。后腹部细长卵形。螫针伸出。

头、前胸背板和后腹部光亮;中胸和并胸腹节具细纵刻纹,其间面具刻点;结节刻点弱,较光亮。体被丰富的直立、亚直立毛。茸毛仅存在于触角鞭节和足跗节。体黄褐色至红褐色。头两侧具黄白色大侧斑。

分布 广西各地,安徽、湖北、湖南、江西、云南、四川、浙江、海南;印度、菲律宾、泰国、印度尼西亚。

(39) 宾氏双节行军蚁 *Aenictus binghami* Forel 1900 (图 78~79)

Aenictus binghami Forel, 1900 *Ann. Soc. Ent. Belg.* 44: 76.

Aenictus (Typhlatta) binghami var. *gatesi* Wheeler, 1927 *Psyche* 34: 42.

工蚁 TL 4.8~5.2, HL 0.95~1.04, HW 0.80~0.90, CI 83~85, SL 0.85~0.95, SI 106~108, PW 0.48~0.58, AL 1.50~1.62.

头卵圆形,长大于宽,头侧具浅黄色侧斑。上颚具1枚端齿、1枚亚端齿和4~5枚小齿。唇基突出,前缘具齿列。触角10节,柄节超过后头缘。缺复眼和单眼。前胸、中胸背板凸;并胸腹节基面平,其末端向后降低,斜面内凹,基面与斜面连接处锐角形。结节、腹柄下突及后腹部似光柄行军蚁。

上颚具细弱刻点和刻纹,仍较光亮;头及后腹部光亮。并腹胸和第1结节刻点粗密;中胸和并胸腹节具细密纵刻纹和粗密刻点;第2结节刻点细,较光亮。立毛中等丰富。茸毛仅存在于触角鞭节和足跗节。体暗红褐色。触角和足跗节色稍浅。

分布 广西(田林、上思、陇瑞、弄岗),云南;印度、缅甸、泰国。




图 78~79 宾氏双节行军蚁 *Aenictus binghami* Forel (工蚁)

78. 头部正面观 79. 体侧面观

(40) 齿突双节行军蚁 *Aenictus dentatus* Forel 1911 (图 80~81)

Aenictus aitkeni var. *dentatus* Forel, 1911 *Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat.* 47: 383.

Aenictus dentatus Forel, Wilson, 1964 *Pacif. Inse.* 6: 460.

Aenictus dentatus Forel, Bolton, 1995 *New Cat. Ants World*: 59.

工蚁 TL 4.2~4.6, HL 0.90~0.93, HW 0.85~0.86, CI 91~93, SL 1.03~1.08, SI 121~125, PW 0.54~0.57, AL 1.46~1.52.

头长方形,长略大于宽。唇基前缘圆形,缺齿。侧额脊发达,长0.49 mm,侧面观呈三角形突起。上颚宽三角形,咀嚼缘具端齿、亚端齿和11枚细齿;两上颚闭合后与唇基前缘无缝隙。触角柄节超过后头缘。前胸背板较凸;中胸背板较低平,在与并胸腹节连接处略下凹,缺背板缝;并胸腹节基面