

和第2结节前部具网状细刻点。第2结节后部和后腹部光亮。毛被中等密度。体黄色稍带褐色，中胸、并胸腹节和第1结节褐色成分更多。

分布 广西(猫儿山、十万大山)，湖北、安徽、四川、广东；菲律宾。

(42) 博白双节行军蚁 *Aenictus bobaiensis* Zhou et Chen 1999 (图 84~85)

Aenictus bobaiensis Zhou et Chen, 1999 *Guangx. Sci.* 6(1):63.

工蚁 TL 4.3~4.8, HL 0.93~1.00, HW 0.88~0.98, CI 101~103, SL 0.91~0.99, SI 101~103, PW 0.57~0.64, AL 1.46~1.55.

头长大于宽，两侧缘微凸，后头缘近平直。唇基前缘圆，缺齿。上颚宽三角形，具端齿、亚端齿和8个小齿，两上颚闭合时与唇基前缘之间无缝隙。侧额脊较发达，但较齿突双节行军蚁低平。触角柄节超过后头缘。前胸背板较凸，与中背板形成弱弓形；中胸背板向后降低；并胸腹节基面长，微凸，基面与斜面连接处具低脊。第1结节腹面的腹柄下突发达，其后角突出，钝角形。后腹部长卵形。足长。




图 84~85 博白双节行军蚁 *Aenictus bobaiensis* Zhou et Chen(工蚁)

84. 头部正面观 85. 体侧面观

刻点与齿突双节行军蚁相似；并腹胸和结节上的纵刻纹较齿突双节行军蚁稀疏，短皱纹较多；毛被与齿突双节行军蚁相似。体暗红褐色。头、并腹胸背面、中胸侧板及后腹部红黑色；触角端部数节、足基节、转节、跗节以及后腹部末端色略浅。

分布 广西(博白)。