

(58) 异形瘤颚蚁 *Strumigenys leptorrhina* Bolton 2000 (图 121~125)

*Strumigenys leptorrhina* Bolton, 2000 Mem. Amer. Ent. Inst., 65: 886.

工蚁 TL 2.2~2.3, HL 0.60~0.61, HW 0.39~0.41, CI 63~68, SL 0.35~0.37, SI 87~94, ML 0.28~0.30, MI 46~49, WL 0.61~0.65, FCD(额脊距)0.15~0.16, FCI(额脊距与头宽之比)37~39, ED 0.06~0.07.

上颚细长, 外侧缘微凸; 内缘近平直; 亚端齿明显呈刺状, 端部具2枚刺状齿, 二齿间无细齿。唇基前缘中部深凹。触角6节, 柄节细长, 基部稍弯曲; 第2节长大于宽; 第3节和第4节长宽近相等; 各节之比约为13:3:1:1:4:8.5。复眼较小, 具8个小眼面, 最大直径0.05 mm。侧面观, 并腹胸背面平; 中胸背板向后倾斜; 并胸腹节基面稍凸; 并胸腹节刺尖细。结节背面观宽大于长, 第2结节背面宽为长的1.5倍。腹柄海绵状附属物发达。




图 121~125 异形瘤颚蚁 *Strumigenys leptorrhina* Bolton(工蚁和雌蚁)

121~123. 工蚁 124~125. 雌蚁 121,124. 头部正面观 122,125. 体侧面观 123. 上颚端齿

头部背面、触角柄节、并腹胸、足和两结节均具细网状刻纹。中胸侧板和并胸腹节侧面大部光亮。第2结节背面和后腹部光亮, 基腹节基部具短条纹。头部背面具5对长鞭毛和丰富的短伏毛。唇基前缘具细的匙状毛。触角柄节前缘具8~9根细而向前弯曲的匙状毛。中胸背板背面具3对长鞭毛, 并胸腹节无长鞭毛。中胸背板最长鞭毛0.13 mm。结节具2对、第2结节具2~3对, 后腹部具多数长鞭毛。体黄褐色。

雌蚁 TL 2.4~2.5, HL 0.62~0.65, HW 0.41~0.43, CI 65~66, SL 0.34~0.37, SI 82~86, ML 0.28~0.30, MI 45~46, FCD 0.15~0.16, FCI 37~39, PW 0.27~0.29, WL 0.65~0.67, ED 0.06~0.07.

上颚和头部与工蚁相似。复眼较大。两结节及后腹部似工蚁。

体表刻纹、毛被和体色同工蚁。

分布 广西(花坪、大瑶山、贺州)。