

*Triglyphothrix tricolor* Donosthorpe, 1948 Ann. Mag. Nat. Hist. (12)1:136.

工蚁 TL 2.3~2.8, HL 0.56~0.70, HW 0.60~0.65, CI 88~94, SL 0.44~0.48, SI 72~76, PW 0.42~0.46, AL 0.63~0.70, ED 0.15~0.16.

头长大于宽,后部宽于前部,后头缘浅宽凹。触角沟明显。触角12节,柄节不到达后头缘。并腹胸宽短;并胸腹节刺长三角形,微上翘,长于后侧叶。后侧叶尖,上翘。第1结节侧面观其背面与后面成弧形,不成角度;背面观长宽近相等;第2结节低,背面观横形,前部稍窄于后部。后腹部卵圆形。

上颚具细纵刻纹;唇基具数条纵脊。头、并腹胸及第1结节背面具粗密网状刻纹;第2结节背面刻纹较弱,后部光亮。体被浓密细长立毛,主要以简单毛和二裂毛形式出现,偶有数根三裂毛;后腹部第1节背板上几乎总是缺三裂毛。头、并腹胸及两结节橙黄色,后腹部红褐色。

雌蚁(国内首次描述) TL 3.2~3.4。体稍大于工蚁;头顶具3单眼;并腹胸厚实;中胸背板及小盾片背面平;并胸腹节刺稍钝;翅微带褐色,透明。其余特征与工蚁相同。

分布 广西(河池、玉林),四川、福建、广东;日本、东南亚。




图 170~171 茸毛铺道蚁 *Tetramorium lanuginosum* Mayr(工蚁)

170. 头部正面观 171. 体侧面观

#### (80) 陕西铺道蚁 *Tetramorium shensiense* Bolton 1977 (图 172~173)

*Tetramorium shensiense* Bolton, 1977 Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Ent.) 36:83.

工蚁 TL 3.5~3.8, HL 0.88~0.92, HW 0.81~0.88, CI 92~95, SL 0.62~0.66, SI 75~76, PW 0.66~0.69, AL 1.03~1.06, ED 0.18~0.20.




图 172~173 陕西铺道蚁 *Tetramorium shensiense* Bolton(工蚁)

172. 头部正面观 173. 体侧面观

头长稍大于宽,后头缘微凹陷。唇基中部凸,具3条明显纵脊,其前缘中央具浅缺刻。额脊明显,向后延伸至头顶。触角沟浅宽。触角11节,端3节形成触角棒。复眼中等大小,突出,位于头侧近中部。前胸背板肩角圆形;并胸腹节刺粗长,末端尖且略上弯。后侧叶钝三角形。结节侧面观背面