

凸,前后面近平行;第2结节低于第1结节。后腹部卵形。

上颚具细纵刻纹;头及并腹胸背面具网状粗刻纹;并腹胸侧面具不规则纵皱纹;两结节具皱纹;第2结节背面和后腹部光亮。立毛较丰富;触角柄节及后足胫节具倒伏毛,无直立毛。体黄褐色。触角鞭节末端及足颜色较浅。

分布 广西(临桂),陕西、江西。

(81) 广西铺道蚁 *Tetramorium guangxiensis* Zhou et Zheng 1997 (图 174~175)

Tetramorium guangxiensis Zhou et Zheng 1997 Entomotax. 19(1):48.

工蚁 TL 3.9~4.2, HL 0.93~0.95, HW 0.91~0.95, CI 96~100, SL 0.62~0.65, SI 66~70, PW 0.62~0.69, AL 1.10~1.14, ED 0.15~0.16.

头(含上颚)近心脏形,前部宽于后部,后头缘凹陷,后头角钝圆。唇基中部突出,具3条发达的纵脊,其前缘中部具缺刻。额脊明显,向后延伸至头顶。触角沟长而宽。触角11节,端3节形成触角棒。复眼中的等大小,突出,位于头侧中部。前胸背板肩角圆形;并胸腹节刺粗长,端部尖,直指后上方,末端不弯曲;后侧叶三角形,顶端尖。第1结节侧面观长方形,高明显大于长,前后面近平行,背缘微凸,后部略升高;第2结节低,圆形,背面观宽于第1结节。后腹部卵形。

上颚具细纵刻纹;头及并腹胸背面具网状刻纹;触角沟刻纹细弱。并腹胸侧面及两结节具不规则皱纹。后腹部光亮。头及体背面具丰富的直立、亚直立毛,毛长短不一。触角柄节具平伏毛;后足胫节背面具丰富的亚直立毛。体黄褐色。头、体背面及后腹部颜色较深,足颜色较浅。

分布 广西(花坪)。




图 174~175 广西铺道蚁 *Tetramorium guangxiensis* Zhou et Zheng(工蚁)

174. 头部正面观 175. 体侧面观

(82) 史氏铺道蚁 *Tetramorium smithi* Mayr 1879 (图 176~177)

Tetramorium smithi Mayr, 1879 Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 28: 673.

Tetramorium simillimum Forel, 1902 Rev. Suisse Zool. 10: 235.

Tetramorium smithi var. *kanariense* Forel, 1903 Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc. 14: 703.

工蚁 TL 2.4~2.8, HL 0.62~0.68, HW 0.60~0.65, CI 92~98, SL 0.40~0.45, SI 65~75, PW 0.42~0.45, AL 0.65~0.75, ED 0.14~0.16.

头长略大于宽,后部宽于前部。唇基前缘横形。额脊长,超过复眼后缘。触角窝浅宽。触角11节;柄节不到达后头角。前胸背板肩角钝角形;并胸腹节刺直,基部宽,末端尖。后侧叶三角形,端部尖,略上弯。第1结节略呈方形,高稍大于长,前后缘近平行,背面稍凸,背面观长宽近相等;第2结节低于第1结节,背面圆。后腹部卵圆形。

上颚光亮;头及并腹胸背面具纵长刻纹,头顶及前胸背板前缘刻纹呈网状;并腹胸侧面具不规