

则皱纹。第1结节背面多少具凹点或皱纹，第2结节及后腹部光亮。立毛浅黄色，中等密度。体黄褐色。头部背面黄褐色，唇腹部颜色更深。

分布 广西(来宾、钦州)，海南；印度、斯里兰卡、越南、泰国、马来西亚。




图 176~177 史氏铺道蚁 *Tetramorium smithi* Mayr(工蚁)

176. 头部正面观 177. 体侧面观

(83) 铺道蚁 *Tetramorium caespitum* (Linnaeus 1758) (图 178~179)

Formica caespitum Linnaeus, 1758 *Syst. Nat. Ed. 10. I*:581.

Formica fusca Leach, 1825 *Zool. Jour. 2*:290.

Myrmica fuscula Nylander, 1846 *Acta Soc. Sci. Fenn. 2*:935.

Tetramorium caespitum (L.) ; Mayr, 1855 *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 5*:426.

Myrmica modesta F. Smith, 1860 *Jour. Proc. Linn. Soc. Zool. 5*:108.

Tetramorium caespitum subsp. *himalayanum* Viehmeyer, 1914 *Archiv. Nat. 79*:38.

Tetramorium caespitum var. *hammi* Donisthorpe, 1915 *Brit. Ants*:178.

Tetramorium caespitum var. *indocile* Santschi, 1927 *Folia Myrmec. Termit. 1*:53.

Tetramorium caespitum var. *immigans* Santschi, 1927 *ibid. 1*:54.

Tetramorium semilaeve subsp. *transbaicalense* Ruzschy, 1936 *Trudy Biol. Nauch. Issl. Inst. 2*:93.

Myrmica brevinodis var. *transversinodis* Enzmann, 1946 *Jour. N. Y. Ent. Soc. 54*:47.

工蚁 TL 2.6~2.8, HL 0.68~0.70, HW 0.63~0.66, CI 92~96, SL 0.50~0.54, SI 78~82, PW 0.40~0.44, AL 0.75~0.78, ED 0.11~0.13.




图 178~179 铺道蚁 *Tetramorium caespitum* (Linnaeus)(工蚁)

178. 头部正面观 179. 体侧面观

头矩形，后头缘平直或略凹。唇基前缘直。额脊短，不到达复眼中部。触角12节，柄节接近后头角。触角沟宽浅。并胸腹节刺短。后侧叶短小，近三角形。第1结节前后缘呈缓坡形，上部稍窄，背面平；第2结节背面圆，较低。