

上颚具细纵刻纹;头部密集纵长刻纹;并腹胸背面刻纹网状,侧面具密集刻点,刻点在前胸背板侧面呈点条纹。两结节具密集刻点,背面中央及后腹部光亮。立毛中等丰富。触角柄节和后足胫节背面具短的亚直立毛和亚倾斜毛。体褐色至黑褐色。

分布 广西各地,全国各省区;日本、韩国、朝鲜、欧洲、北美。

(84) 相似铺道蚁 *Tetramorium simillimum* (F. Smith 1851) (图 180~181)

Myrmica simillima F. Smith, 1851 *List. Brit. Anim. Brit. Mus.* **6**:118.

Myrmica parallela F. Smith, 1859 *Jour. Proc. Linn. Soc. Lond. Zool.* **3**:147.

Tetramorium simillimum (F. Smith); Mayr, 1861 *Europ. Formicid.* :61.

Tetramorium pygmaeum Emery, 1877 *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova* **9**:371.

Tetramorium simillimum r. *denticulatum* Forel, 1902 *Rev. Suisse Zool.* **10**:235.

Tetramorium pusillum var. *bantouana* Santschi, 1910 *Ann. Soc. Ent. Fr.* **78**:382.

Tetramorium pusillum var. *exoleta* Santschi, 1914 *Boll. Lab. Zool. Portici* **8**:366.

Tetramorium simillimum var. *opacior* Forel, 1913 *Zool. Jahr. Abt. Syst.* **36**:81.

Tetramorium pusillum st. *bantuala* var. *breve* Santschi, 1924 *Rev. Zool. Afr.* **12**:213.

Wasmannia auropunctata subsp. *brevispinosa* Borgmeier, 1928 *Zool. Anz.* **75**:36.

Tetramorium simillimum var. *insulare* Santschi, 1928 *Rev. Suisse Zool.* **35**:69.

工蚁 TL 2.2~2.3, HL 0.56~0.57, HW 0.48~0.51, CI 85~89, SL 0.36~0.40, SI 74~78, PW 0.36~0.38, AL 0.61~0.66, ED 0.11~0.12.

后头缘浅宽凹。唇基前缘完整。额脊明显,延伸至复眼之后,几达后头缘。触角沟浅宽。复眼中等大小。并胸腹节刺短于或至多等于后侧叶长。后侧叶宽三角形。第1结节前角呈角状,后角弧形,结前柄粗;第2结节圆。后腹部卵形。

上颚具弱刻纹;头部背面具弱的纵刻纹,刻纹间密布细弱刻点。触角沟具细弱网状刻点。并腹胸背面具弱的纵刻纹,侧面具密集网状刻点;前胸背板刻纹呈网状,刻纹间具刻点。两结节具较弱的刻纹和刻点。后腹部光亮。头和并腹胸具稀疏短立毛,后腹部立毛较长。触角柄节和后足胫节背面具细短茸毛。体黄褐色。后腹部颜色较深。

分布 广西(桂林、南宁、防城、北海),台湾;印度、斯里兰卡、印度尼西亚、欧洲、非洲。




图 180~181 相似铺道蚁 *Tetramorium simillimum* (F. Smith)(工蚁)

180. 头部正面观 181. 体侧面观

(85) 克氏铺道蚁 *Tetramorium kraepelini* Forel 1905 (图 182~183)

Tetramorium kraepelini Forel, 1905 *Mitt. Naturh. Mus. Hamburg.* **22**:15.

Tetramorium yanoi Santschi, 1937 *Bull. Annls. Soc. Ent. Belg.* **77**:376.