

具数条纵皱纹;第1结节及后腹部光亮。立毛黄色,在头和并腹胸背面稀疏;第2结节具立毛1对,足腿节偶有1~2根立毛;后腹部立毛仅存在于末节。唇基前缘中央具长的中刚毛,其长度超过上颚长的1/2;两侧各具1根长侧刚毛。前胸背板刺上具10根以上极微细的短毛。体橘黄色。足淡黄色;后腹部黄褐色,其基部具大型浅色斑。

**大型工蚁(新发现)** HL 2.6~2.7, HW 2.4~2.5, SL 1.13~1.19, CI 92~93, SI 47~48, WL 1.28~1.32, PL 0.59~0.62, PH 0.47~0.50, DPW 0.25~0.28, PPL 0.31~0.34, PPH 0.53~0.56, PPW 0.53~0.56, TL 7.0~7.3.




图 188~192 光腿刺切叶蚁 *Acanthomyrmex glabfemoralis* Zhou et Zheng(小型工蚁和大型工蚁)

188~190. 小型工蚁 191~192. 大型工蚁 188,191. 头部正面观

189,192. 体侧面观 190. 第1结节背面观

头长稍大于宽,两侧缘近平行,后头缘中央角形深凹,头顶全长具宽而深的中央纵沟。复眼小,最大直径0.22~0.23 mm。唇基前缘中央具浅凹。上颚宽大,咀嚼缘不具齿。触角12节,柄节稍扁,第9节长宽近相等,第10~12节长大于宽。并腹胸短,并胸腹节刺长,略向后弯曲,刺长0.54~0.56 mm。第1结节长为宽的2.3~2.4倍;第2结节高大于长,背面观略呈方形,长宽近相等。后腹部椭圆形,长大于宽。

上颚、唇基和额区光亮无刻点;头部背面两额脊间具粗纵刻纹,头部其余部分具稀疏粗刻点,刻点和刻纹间光亮;并腹胸和两结节具不规则的短纵刻纹;后腹部光亮。立毛细而稀疏,并腹胸2对,第2结节1对,后腹部末端和腹面数对。体红褐色。

**分布** 广西(花坪、大瑶山)。

### 33. 角腹蚁属 *Recurvidris* Bolton 1992

*Trigonogaster* Forel, 1890 Ann. Soc. Ent. Belg. 34: 109.