

凸,中部平直。触角柄节略超过后头缘。复眼中等大小,位于头侧中线之前。前胸背板微凸;中胸背板略向后方倾斜;并胸腹节低,基面短平,斜面长而斜,为基面长的2倍。结节低平,前倾。后腹部宽卵形。

上颚光亮;头和体背面具细密网状刻纹。立毛稀少,仅散布于足基节和后腹部。茸毛细,短而密集,仅在一定光线下可见,后腹部末端较明显。唇基及上颚具长刚毛。头(有时包括并腹胸)褐色、暗红褐色至黑色;并腹胸和后腹部(有时仅为后腹部)黄褐色或黄白色。

分布 广西各地,山东、河南、安徽、云南、四川、湖南、浙江、福建、广东、海南、台湾、香港、澳门;日本、东南亚、澳大利亚、非洲。




图 297~298 黑头酸臭蚁 *Tapinoma melanocephalum* (Fabricius)(工蚁)

297. 头部正面观 298. 体侧面观

(133) 印度酸臭蚁 *Tapinoma indicum* Forel 1895,中国新纪录(图 299~300)

Tapinoma indicum Forel, 1895 *Jour. Bomb. N. H. Soc.* 9: 472.

Tapinoma melanocephalum sub. *Indicum* Forel, 1909 *Not. Leyd. Mus.* 31: 228.

Tapinoma indicum Forel; Emery, 1912 *Gen. Ins. Fasc.* 137: 44.

工蚁 TL 1.5~1.8, HL 0.42~0.43, HW 0.40~0.41, CI 92~95, SL 0.32~0.35, SI 78~80, PW 0.24~0.26, AL 0.45~0.48 ED 0.08~0.10.

形态与黑头酸臭蚁很相似。不同之处为:触角较短,柄节不到达后头缘,柄节比小于80;前胸背板宽,中胸背板较侧扁;体色为一致的橙黄色或黄褐色。

分布 广西(桂林);印度。




图 299~300 印度酸臭蚁 *Tapinoma indicum* Forel,中国新纪录(工蚁)

299. 头部正面观 300. 体侧面观

46. 穴臭蚁属 *Bothriomyrmex* Emery 1869

Bothriomyrmex Emery, 1869 *Ann. Mus. Zool.* 5: 117.

Chronoxenus Sanntsch, 1920 *Rev. Zool. Afr.* 7: 202.