

全身被密集细茸毛。体黑色。上颚红褐色至黄褐色；各足跗节淡黄色至黄白色。

分布 广西各地，山东、湖南、云南、福建、广东、海南、台湾；日本、东南亚、澳大利亚。




图 315~316 白跗节狡臭蚁 *Technomyrmex albipes* (F. Smith) (工蚁)

315. 头部正面观 316. 体侧面观

(142) 长角狡臭蚁 *Technomyrmex antennus*, 新种 (图 317~318)

正模工蚁 TL 4.1, HL 0.88, HW 0.77, CI 87, SL 1.06, SI 137, PW 0.57, AL 1.32, ED 0.25.

头(含上颚)心形，前窄后宽，两侧缘微凸，后头缘浅宽凹，头顶具明显的沟状凹陷。上颚咀嚼缘具 11 齿，由端部向基部变小。唇基前缘中部具深的 U 形凹陷，后缘清晰。额脊短，绕触角窝向后发散。触角粗长，柄节 1/3 超过后头缘。复眼大，略凸，位于头中线之前，靠近触角窝。前胸、中胸背板背面稍平；中胸背板后半部向后倾斜；前-中胸背板缝明显，中-并胸腹节缝深凹；并胸腹节基面向前倾斜，斜面向后倾斜，二者相交处侧面观近呈直角；斜面长约为基面长的 2 倍。结节低而前倾。后腹部前面极凸，悬覆于结节之上；腹末孔开口于后腹末端。足较粗长。

上颚光亮；头、并腹胸及后腹部具清晰的细密网状刻纹，几无光泽；并胸腹节斜面刻纹较弱，有一定光泽。立毛稀少，仅在唇基具 2 根，后腹部背面散布数根；头部背面及并腹胸缺立毛。唇基前缘具 4 根粗硬刚毛；上颚具倒伏长毛。短茸毛被密集，在头、触角柄节、足及后腹部明显，在并腹胸细，仅在一定光线下可见。体红褐色。后腹部染较多褐色；触角及足黄褐色；中、后足基节黄白色。

副模 21 工蚁 TL 3.0~4.2, HL 0.70~0.90, HW 0.66~0.78, CI 86~94, SL 0.75~1.10, SI 113~138, PW 0.46~0.58, AL 0.94~1.35, ED 0.19~0.25.

正模工蚁，广西花坪自然保护区，1995.VII.9，周善义采。副模：1 工蚁，广西融安县，1995.IX.21，周善义采；20 工蚁，广西临桂县，1996.VII.7，周善义采。

本新种与荷狡臭蚁 *T. horni* Forel 相似，但新种体具清晰的细密网状刻纹，几无光泽，触角柄节 1/3 超过后头缘，头及并腹胸无立毛而可与之相区别。




图 317~318 长角狡臭蚁 *Technomyrmex antennus*, 新种(工蚁)

317. 头部正面观 318. 体侧面观