

于头中线之前。前胸背板平；中胸背板略向后倾斜；中胸侧面观明显缢缩；并胸腹节基面向前面倾斜，后端高，约与斜面等长，斜面斜截，二者交接处呈钝圆角形。结节前面直，后面微凸，前倾，其顶端尖，背缘弧形。后腹部长卵形，背面凸，前面具容纳结节的凹陷。

上颚具细纵刻纹；全身具粗密网状刻纹，暗；仅在前胸背板侧面及中胸侧板刻纹较弱，略具光泽。立毛红褐色；头前部及后腹部立毛较长，头后部立毛短；前胸背板具2对、中胸背板具1对细短立毛。短茸毛密集。触角柄节及后足胫节具稀疏亚直立短毛和密集茸毛。头橙褐色，头顶较暗；并腹胸及结节栗褐色；后腹部黑褐色；上颚、唇基、触角及足黄褐色。

分布 广西(花坪)。




图 339~340 暗前结蚁 *Prenolepis umbra* Zhou et Zheng (工蚁)

339. 头部正面观 340. 体侧面观

(154) 内氏前结蚁 *Prenolepis naoroji* Forel 1902 (图 341~342)

Prenolepis naoroji Forel, 1902 Ann. Soc. Ent. Belg. 46: 290.

工蚁 TL 3.2~3.7, HL 0.70~0.75, HW 0.56~0.58, CI 74~82, SL 1.07~1.12, SI 187~189, PW 0.45~0.48, AL 1.00~1.16, ED 0.21~0.22.

头宽卵圆形。上颚咀嚼缘具6齿。唇基中部多少呈脊状突起，似纵脊。触角柄节1/2以上超过后头缘。复眼大而突出，位于头中线之后。并腹胸较长；中胸显著缢缩；前胸、中胸形成一凸面，与并胸腹节凸面大小相近。结节厚，前倾。后腹部短宽，背面凸，前面明显凹陷。

上颚光亮，仅基部具极细弱的纵刻纹；唇基、头及体光亮；后腹部具极弱的网状刻纹。立毛黄色，细长；在头和并腹胸中等密度，在后腹部较长而密集，倾斜且弯曲。茸毛被极稀疏。头、并腹胸及结节黄色至黄褐色，后腹部褐色。

分布 广西(三江、隆林、河池、十万大山)，江西、湖北、湖南、贵州、四川、福建；印度、缅甸。




图 341~342 内氏前结蚁 *Prenolepis naoroji* Forel (工蚁)

341. 头部正面观 342. 体侧面观