

腹胸成对排列。茸毛稀疏细短,仅在一定光线下可见。体暗黄褐色至黑褐色。触角和足较浅。

分布 广西各地,湖南、贵州、浙江、福建、广东、海南、台湾、香港、澳门;全世界各热带、亚热带地区。




图 349~350 长角立毛蚁 *Paratrechina longicornis* (Latreille) (工蚁)

349. 头部正面观 350. 体侧面观

(160) 全唇立毛蚁 *Paratrechina integera*, 新种 (图 351~352)

正模工蚁 TL 2.2, HL 0.61, HW 0.46, CI 75, SL 0.93, SI 202, PW 0.35, AL 0.85, ED 0.15.

头矩形,两侧缘直,后头缘凸,不具边缘。上颚细长,咀嚼缘具5齿,基齿与亚基齿相距宽。唇基中部凸,前缘圆,不具缺刻。触角柄节细长,1/2以上超过后头缘。复眼大而凸,位于头侧中线靠前。前胸背板稍凸;前-中胸背板缝明显;中胸背板向后倾斜;中-并胸腹节缝清晰,但不深凹;并胸腹节基面与斜面约等长,基面平滑过渡到斜面,斜面倾斜。结节前面短直,后面长而斜,背缘平直。后腹部宽卵形,背面凸,前面具凹陷。




图 351~352 全唇立毛蚁 *Paratrechina integera*, 新种 (工蚁)

351. 头部正面观 352. 体侧面观

上颚具不明显的弱刻纹;头及后腹部具微弱网状刻纹;体其余部分光滑铮亮。立毛黄色略带红色,较粗钝,稀疏;在头顶及后腹部较多;前胸背板长立毛1对,第1对长立毛两侧各具短立毛1根;中胸背板立毛1对;并胸腹节、结节、触角柄节及足胫节无立毛。茸毛被细短,在头及后腹部较多;在并胸腹节稀疏;在触角柄节及足胫节密集。体橙黄色。头顶颜色略深;上颚、唇基、触角及足黄色;后腹部褐色。

副模 29 工蚁 TL 2.2~2.3, HL 0.61~0.62, HW 0.45~0.46, CI 72~75, SL 0.93~0.96, SI