

分布 广西(桂林),安徽、四川、台湾。

(164) 黄立毛蚁 *Paratrechina flavipes* (F. Smith 1874) (图 359~360)

*Tapinoma flavipes* F. Smith, 1874 *Trans. Ent. Soc. London*: 404.

*Prenolepis flavipes* (F. Smith); Mayr, 1886 *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* 36: 362.

*Paratrechina (Nylanderia) flavipes* (F. Smith); Emery, 1925 *Genera Inse. Fasc. 183*: 220.

*Paratrechina flavipes* (F. Smith); Trager, 1984 *Sociobiol.* 9: 97.

工蚁 TL 2.1~2.3, HL 0.60~0.63, HW 0.50~0.52, CI 82~83, SL 0.68~0.70, SI 133~136, PW 0.37~0.40, AL 0.70~0.78, ED 0.15~0.16.

头长略大于宽,两侧缘稍凸,后头缘中央略凹。上颚咀嚼缘具6齿,基齿与亚基齿大小相似,第3齿最小。唇基中部凸,前缘平或略呈弧形内凹。触角柄节超过后头缘。复眼大,略凸,位于头前部。前胸背板略凸;中胸背板向后倾斜;并胸腹节斜面约为基面长的2倍。结节三角形,前倾,背缘圆凸。后腹部短宽。

上颚隐约可见细纵纹;头部略具刻点,稍暗;体其余部分光亮。立毛红褐色,在头及后腹部丰富;前胸、中胸各具2对立毛。茸毛细而短,在头前部和后腹部较明显,并腹胸茸毛仅在一定光线下可见。体黄色至黄褐色。头顶略暗;后腹部褐色;上颚、触角及足颜色较浅。

分布 广西(花坪、兴安、藤县、玉林),北京、山东、河南、上海、江苏、安徽、江西、浙江、湖北、湖南、云南、四川;东亚、北美。

本种与原描述略有差别:上颚具6齿(闭合时基齿常被唇基遮盖,看似5齿);后腹部具明显茸毛。




图 359~360 黄立毛蚁 *Paratrechina flavipes* (F. Smith)(工蚁)

359. 头部正面观 360. 体侧面观

(165) 夏氏立毛蚁 *Paratrechina sharpii* (Forel 1899) (图 361~362)

*Prenolepis sharpii* Forel, 1899 *Faun. Hawaii. Hym. Formicid.*: 121.

*Paratrechina (Nylanderia) sharpii* (Forel); Emery, 1925 *Genera Inse. Fasc. 183*: 221.

*Paratrechia sharpii* (Forel); Bolton, 1995 *New Cat. Ants World*: 315.

工蚁 TL 2.1~2.5, HL 0.63~0.70, HW 0.53~0.61, CI 84~87, SL 0.73~0.76, SI 124~137, PW 0.38~0.43, AL 0.80~0.85, ED 0.15~0.16.

与黄立毛蚁相似,不同之处为:唇基前缘明显呈弧形凹陷;头部复眼前后均具密集茸毛;后腹部缺茸毛而具倒伏细毛;体暗红褐色。

分布 广西各地,安徽、湖北、湖南、浙江、云南、四川;美国夏威夷岛。