

后头缘。复眼位于头中线偏后。单眼3个。前胸背板稍凸；中胸背板前后缘低，中部凸，使前、中胸形成双凸状；中-并胸腹节缝深凹；并胸腹节基面短平；斜面斜截，2倍以上长于基面。结节薄，鳞片状，背缘平或中部略凹。后腹部宽卵形，背面凸，悬覆于结节之上；其前面具凹陷。

上颚具细纵刻纹；头及体具密集网状刻纹，略具光泽。立毛黄色，丰富。细茸毛密集。体黄色，头顶颜色较深，后腹部黄褐色，上颚红褐色。

分布 广西(猫儿山、临桂)，北京、黑龙江、辽宁、内蒙古、新疆、山西、海南；东亚至北美。

(173) 亮毛蚁 *Lasius fuliginosus* (Latreille 1798) (图 378~379)

Formica fuliginosa Latreille, 1798 *Ess. Hist. Fourm. France*: 36.

Lasius fuliginosus (Latreille); Mayr, 1861 *Europ. Formic.* 49.

Lasius fuliginosus var. *nipponensis* Forel, 1912 *Ann. Soc. Ent. Belg.* 56: 339.

Lasius fuliginosus var. *orientalis* Karavaiev, 1912 *Russk. Ent. Oboz.* 12: 586.

Lasius fuliginosus (Latreille); Wilson, 1955 *Bull. Mus. Comp. Zool.* 113: 138.

工蚁 TL 4.4~5.0, HL 1.35~1.38, HW 1.32~1.35, CI 95~100, SL 1.19~1.22, SI 88~92, PW 0.75~0.78, AL 1.41~1.44, ED 0.25~0.28.

头(含上颚)近三角形，两侧缘凸，后头缘中部略凹。上颚短，强壮，咀嚼缘具6齿。唇基长大于宽，具不明显的中脊。触角柄节略超过后头缘。并胸腹节短，背面较凸，中胸背板略后斜，背面观钝圆；中-并胸腹节背板缝深凹；并胸腹节背面观后部宽于前部，侧面观基面向后抬高；斜面平。结节楔形，背缘中央略凹。后腹部短，略小于头部。

头及体光亮。立毛稀疏，仅在后腹部较丰富。茸毛稀少。体黑色略带深栗红色；触角和足红褐色。

分布 广西(猫儿山)，全国大部分省区；亚洲、非洲、欧洲、北美洲。




图 378~379 亮毛蚁 *Lasius fuliginosus* (Latreille) (工蚁)

378. 头部正面观 379. 体侧面观

62. 织叶蚁属 *Oecophylla* F. Smith 1860

Oecophylla F. Smith, 1860 *Jour. Proc. Linn. Soc. Zool.* 4: 101.

Oecophylla F. Smith; Bingham, 1903 *Faun. Brit. Ind. Hym.* 2: 310.

Oecophylla F. Smith; Bolton, 1995 *New Cat. Ants world*: 40.

模式种 *Oecophylla smaragdina* (Fabricius 1775)

(= *Formica smaragdina* Fabricius 1775)

工蚁 体中型。大型工蚁和小型工蚁差别不明显。头后部显著宽于前部，后头缘平直。上颚长，