

129, PW 1.06~1.16, AL 2.13~2.29, ED 0.42~0.47.

头前部稍窄于后部, 后头缘几乎平直。唇基具中脊, 前缘弧形凹陷。额脊前端较窄, 后端向后发散。并腹胸背面平, 前宽后窄; 全长具棱边; 前-中胸背板缝凹陷; 中-并胸腹节缝处形成一脊突; 并胸腹节基面末端两侧具短钝齿, 斜面几垂直。结节基部厚, 端部薄, 前后面凸; 端部两侧具长刺, 长刺之间具2齿。后腹部宽卵形。

上颚具密集细刻点及稀疏具毛粗刻点, 稍有光泽; 头及并腹胸背面具有规则的纵刻纹; 并腹胸侧面及结节具粗密刻点; 后腹部刻点细密。立毛黄色, 稀疏; 散生于头部、后腹部末端及足基节。茸毛细短; 在头和并腹胸较稀疏, 在后腹部较密。体黑色; 上颚和足(有些个体包括唇基、触角甚至后腹部)红褐色。

分布 广西(三江、天峨), 浙江、福建、海南; 缅甸、老挝。

(181) 始兴多刺蚁 *Polyrhachis shixingensis* Wu et Wang 1995 (图 397~398)

Polyrhachis shixingensis Wu et Wang, 1995 *Ants Chin.* 166.

工蚁 TL 6.1, HL 1.62, HW 1.41, CI 87, SL 1.60, SI 113, PW 0.97, AL 2.01, ED 0.44.

头卵圆形, 两侧缘及后头缘凸。上颚咀嚼缘具5齿。唇基具中脊, 中叶突出, 前端略上翘, 两侧缘略呈直角。额脊相距窄, 最窄处相距0.39 mm。并腹胸全长具边缘; 前胸背板两侧角圆; 前-中胸背板缝及中-并胸腹节背板缝明显; 并胸腹节背板低于中胸背板, 基面平, 斜面凹; 基面末端具2长直刺, 刺三角形, 基部宽。结节前面直, 后面略凹; 顶端具2长刺, 斜向后上方。后腹部卵圆形。

头、并腹胸及结节具精细网状刻纹; 后腹部刻纹更细, 光亮。立毛稀疏, 限于头部及后腹部末端。茸毛稀疏, 细短。体黑色; 上颚、触角鞭节末端、足及后腹部末端黄褐色。

分布 广西(贺州市)、广东。




图 397~398 始兴多刺蚁 *Polyrhachis shixingensis* Wu et Wang(工蚁)

397. 头部正面观 398. 体侧面观

(182) 罗杰氏多刺蚁 *Polyrhachis punctillata* Roger 1863 (图 399~401)

Polyrhachis punctillata Roger, 1863 *Berlin. Ent. Zeit.* 7: 152.

Polyrhachis punctillata Roger; Bingham, 1903 *Faun. Brüt. Ind. Hym.* 2: 409.

工蚁 TL 6.6~7.3, HL 1.54~1.72, HW 1.28~1.47, CI 83~86, SL 1.82~2.07, SI 135~142, PW 0.94~1.22, AL 1.88~2.23, ED 0.34~0.37.

头后部略宽于前部, 后头缘圆。唇基中脊不明显。额脊相距较宽。并腹胸全长具棱边, 在前-中胸背板缝和中-并胸腹节缝处具缺刻; 背板前部宽, 向后变窄; 前胸背板前缘波形, 两肩角形成粗齿;